

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РФ
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Утверждены
распоряжением
Комитета по здравоохранению
Правительства Санкт-Петербурга
от _____ 2006 года № ____

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по амбулаторному лечению заболеваний, при которых лекарственные
средства по рецептам врачей отпускаются бесплатно

Санкт-Петербург
2006

УДК 615.2-053.2/5
ББК 57.3
С79

Методические рекомендации по амбулаторному лечению заболеваний, при которых лекарственные средства по рецептам врачей отпускаются бесплатно / Под ред. проф. А.К. Хаджидиса. - СПб., 2006. - 129 с.

Под общей редакцией главного клинического фармаколога Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга профессора А.К. Хаджидиса.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Авторы.....	7
Методика создания рекомендаций	9
Введение	10
Лечение неврологических заболеваний	
у взрослых	12
Нервно-мышечные болезни.....	12
Болезнь Паркинсона, синдром паркинсонизма.....	12
Рассеянный склероз.....	12
Лечение неврологических заболеваний у детей	13
Детский церебральный паралич	13
Лечение дизентерии и острых кишечных	
инфекций	15
Лечение больных вирусными	
гепатитами «В» и «С».....	16
Лечение оппортунистических заболеваний	
у больных ВИЧ/СПИДом	17
Лечение пациентов, перенесших	
трансплантацию органов и тканей.....	18
Лечение аллергических заболеваний	
у взрослых	22
Аллергический ринит	22
Атопический дерматит	22
Крапивница и отек Квинке.....	23
Аллергическая бронхиальная астма	23
Лечение аллергических заболеваний у детей.....	25
Атопический дерматит	25
Аллергический ринит	25
Лечение урологических заболеваний	26
Доброкачественная гиперплазия	
предстательной железы	26
Лечение ревматических заболеваний.....	27
Системная красная волчанка, дерматомиозит, спондилоар-	
трит, ревматизм, ревматоидный	
артрит, ювенильный ревматоидный артрит,	
псориатическая артропатия.....	27
Лечение больных с сердечно-сосудистыми	
заболеваниями.....	32
Острый инфаркт миокарда	32
Лечение заболеваний легких.....	35
Муковисцидоз	35

Бронхиальная астма у взрослых	38
Хроническая обструктивная болезнь легких	42
Бронхиальная астма у детей	45
Лечение дерматовенерологических заболеваний	48
Ихтиоз	48
Системный микоз	48
Системный кандидоз	48
Саркома Капоши	48
Лимфома	48
Склеродермия	48
Хроническая пиодермия	49
Красная волчанка	49
Красный волосяной лишай Девержи	49
Псориаз	49
Атопический дерматит	50
Герпетиформный дерматит Дюринга	50
Буллезный пемфигоид	50
Пузырчатка	50
Сифилис	51
Лечение офтальмологических заболеваний	53
Закрытоугольная глаукома	53
Открытоугольная глаукома	53
Глаукома, катаракта	54
Лечение психических заболеваний у взрослых	56
Органическое поражение головного мозга	56
Аффективный психоз	57
Эпилепсия	57
Шизофрения	58
Лечение психических заболеваний у детей	60
Эпилепсия	60
Шизофрения	63
Смешанное специфическое расстройство психологического развития	66
Умственная отсталость	67
Другие психические непсихотические расстройства (неврозоподобные)	67
Лечение туберкулёза	69
Лечение сахарного диабета	70
Сахарный диабет	70
Тяжелые гипогликемические состояния	73
Средства введения инсулина и самоконтроля сахарного диабета	74

Лечение эндокринных заболеваний у взрослых	76
Несахарный диабет	76
Гипотиреоз	76
Диффузный токсический зоб	76
Недостаточность коры надпочечников	76
Лечение эндокринных заболеваний у детей	77
Несахарный диабет	77
Лечение онкологических заболеваний	78
Рак молочной железы	78
Неходжкинские лимфомы	81
Лимфогранулематоз (болезнь Ходжкина; лимфома Ходжкина)	82
Рак головы и шеи, химиотерапия	84
Лимфомы кожи, саркома Капоши, грибовидный микоз (распространенные формы)	84
Лак легкого	85
Злокачественные опухоли яичка (семинома и несемином- ные), местнораспро-страненные диссеминированные формы (включая адьювантную терапию)	86
Злокачественные опухоли головного мозга (химиотерапия)	86
Диссеминированная меланома кожи	86
Рак почки, распространенные формы, гормоно- и иммунотерапия	87
Рак яичников II-IV стадий (неoadьювантная химиотерапия и химиотерапия после циторедуктивных операций)	87
Рак тела матки	88
Рак мочевого пузыря	89
Рак органов желудочно-кишечного тракта (колоректальный рак, рак поджелудочной железы, рак желудка, рак желчных протоков, желчного пузыря) – аденокарцинома	89
Рак предстательной железы (местнораспространенные и диссеминированные формы, гормонотерапия)	90
Вспомогательные препараты при химиотерапии, злокачественных опухолей различных локализаций	91
Лечение онкогематологических заболеваний	92
Острый лейкоз	92
Онкогематологические больные после трансплантации гемопозитических стволовых клеток	94
Множественная миелома	95
Неходжкинские лимфомы, лимфома Ходжкина	96

Лимфома Ходжкина	98
Хронический лимфолейкоз	101
Хронический миелолейкоз	104
Сублейкемический миелоз	104
Истинная полицитемия	105
Апластическая анемия	105
Иммунная тромбоцитопеническая пурпура	106
Гемоглобинозы	106
Миелодиспластический синдром	106
Гемофилия А	109
Гемофилия В	110
Гемофилия А и В, ингибиторная форма	110
Болезнь Виллебранда	111
Врожденный дефицит фактора X	112
Врожденный дефицит фактора VII	112
Врожденный дефицит фактора V	113
Врожденный или приобретенный дефицит фактора II	113
Лечение больных с терминальной хронической почечной недостаточностью	114
Лечение больных, находящихся на гемодиализе	119
Терминальная хроническая почечная недостаточность ...	119
Лечение больных, находящихся на перитонеальном диализе	124

АВТОРЫ

- Хаджидис А.К.** - главный специалист по клинической фармакологии.
- Абдулкадыров К.М.** – главный специалист, руководитель отдела «Гематология» ФГУ РНИИГТ Росздрава, д.м.н., профессор.
- Астахов Ю.С.** - главный офтальмолог Комитета по здравоохранению, заведующий кафедрой глазных болезней СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, д.м.н., профессор.
- Бабак С.В.** - клинический фармаколог Городской многопрофильной больницы № 2.
- Барчук А.С.** - главный онколог Комитета по здравоохранению, руководитель хирургического отделения НИИ онкологии им. Петрова, д.м.н., профессор.
- Башнина Е.Б.** - главный детский эндокринолог Комитета по здравоохранению, доцент кафедры детских болезней № 1 с курсом клинической фармакологии СПбГПМА, к.м.н.
- Бондаренко Б.Б.** - д.м.н., профессор.
- Бурбелло А.Т.** - заведующая кафедрой клинической фармакологии Санкт-Петербургской государственной медицинской академии им. И.И. Мечникова, д.м.н., профессор.
- Ворохобина Н.В.** - главный эндокринолог Комитета по здравоохранению, заведующая кафедрой эндокринологии СПбМАПО, д.м.н., профессор.
- Галибин О.В.** – заведующий отделом экспериментальной медицины лаборатории трансплантологии, профессор кафедры гематологии, трансфузиологии и трансплантологии СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, д.м.н.
- Гришко А.Н.** – советник директора ФГУ «СПб НИИФ Росздрава», д.м.н.
- Жемков В.Ф.** главный врач городского противотуберкулезного диспансера СПб, к.м.н.
- Игнатов Ю.Д.** - проректор по научной работе Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, заведующий кафедрой клинической фармакологии Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, академик РАМН, д.м.н.
- Илькович М.М.** - главный пульмонолог Комитета по здравоохранению, заместитель директора по научно-лечебной работе ГНЦ пульмонологии МЗ РФ, руководитель отделения терапии интерстициальных заболеваний легких, д.м.н., профессор.
- Карпенко М.А.** – зам. директора ФГУ НИИ кардиологии им. В.А. Алмазова Росздрава д.м.н., профессор.
- Карпов О.И.** - профессор кафедры клинической фармакологии Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, д.м.н., кафедры инфекционных болезней с курсом лабораторной диагностики СПИД СПб МАПО.
- Карпова И.А.** – Главный диабетолог Комитета по здравоохранению, к.м.н.

- Команденко М.С.** - главный нефролог Комитета по здравоохранению, профессор кафедры внутренних болезней СПбГМА им. Мечникова, д.м.н.
- Комяков Б.К.** - профессор, главный уролог Комитета по здравоохранению.
- Лазебник Т.А.** - главный детский невролог Комитета по здравоохранению, доцент кафедры детской неврологии и нейрохирургии СПб МАПО, к.м.н.
- Левашов Ю.Н.** - Главный фтизиатр Комитета по здравоохранению, директор ФГУ «СПб НИИФ Росздрава», Заслуженный деятель науки РФ, Чл-корр. РАМН, д.м.н., профессор.
- Мазуров В.И.** - главный ревматолог Комитета по здравоохранению, заведующий кафедрой терапии № 1 им. Эйхвальда (с курсами ревматологии и экспертизы трудоспособности) СПбМАПО, проректор по научной работе, д.м.н., профессор, чл.-корр. РАМН, з.д.н. РФ.
- Макарова И.В.** - главный детский аллерголог Комитета по здравоохранению, ассистент кафедры педиатрии № 3 СПбГПМА, к.м.н.
- Разнатовский К.И.** - главный дерматовенеролог Комитета по здравоохранению, заведующий кафедрой дерматовенерологии СПбМАПО, д.м.н., профессор.
- Рахманова А.Г.** - главный инфекционист Комитета по здравоохранению, профессор.
- Рубина Л.П.** - главный врач Центра восстановительного лечения «Детская психиатрия», к.м.н.
- Литвинцев С.В.** - главный психиатр Комитета по здравоохранению
- Севостьянова Л.Д.** - ведущий специалист отдела по организации медицинской помощи матерям и детям Комитета по здравоохранению.
- Симаненков В.И.** - главный терапевт Комитета по здравоохранению, заведующий кафедрой терапии и клинической фармакологии СПб МАПО, д.м.н., профессор.
- Скоромец А.А.** - главный невролог Комитета по здравоохранению, заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, д.м.н., профессор, академик РАМН, з.д.н. РФ.
- Федосеев Г.Б.** - главный аллерголог Комитета по здравоохранению, заведующий кафедрой госпитальной терапии СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, д.м.н., профессор, з.д.н. РФ.
- Шабанов П.Д.** - заведующий кафедрой фармакологии Военно-медицинской академии, д.м.н., профессор.
- Шемеровская Т.Г.** - главный врач Городской больницы № 25,
- Шигашов Д.Ю.** - заведующий городским организационно-методическим отделом по психиатрии, к.м.н.
- Шляхто Е.В.** - главный кардиолог Комитета по здравоохранению, директор ФГУ НИИ кардиологии им. В.А. Алмазова Росздрава, заведующий кафедрой факультетской терапии СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, д.м.н., профессор.
- Шпаковская Л.Р.** – зам. Главного врача противотуберкулезного диспансера СПб, к.м.н..
- Эрман Л.В.** - главный педиатр Комитета по здравоохранению, заведующий кафедрой детских болезней № 1 СПбГПМА, д.м.н., профессор.

МЕТОДИКА СОЗДАНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ

I. Методика создания методических рекомендаций.

Цель: совершенствование системы обеспечения льготных категорий жителей Санкт-Петербурга лекарственными средствами в соответствии с действующим законодательством.

II. Этапы создания методических рекомендаций.

Первый этап: создание рабочей группы.

Второй этап: выработка показателей, принципов, методики, техники и формы создания методических рекомендаций.

Третий этап: принятие методических рекомендаций и предложения их внедрения в Санкт-Петербурге.

В результате в основу методических рекомендаций положены:

- качественный показатель (мнение экспертов),
- нозологический принцип (схемы лечения заболеваний),
- формальная методика,
- техника Дельфи.

Техника Дельфи:

- 1) назначение координатора;
- 2) разработка вопросника;
- 3) выбор экспертов;
- 4) разработка обзоров и алгоритмов для нозологических групп;
- 5) первый раунд;
- 6) анализ результатов;
- 7) второй раунд;
- 8) выработка консенсуса (при <15% разницы в ответах).

ВВЕДЕНИЕ

Перед Вами второе обновление издания методических рекомендаций по амбулаторному лечению заболеваний, при которых лекарственные средства отпускаются бесплатно. С момента выхода в свет первого издания методических рекомендаций в 2004 году произошли известные изменения в сфере лекарственного обеспечения льготных категорий граждан РФ и в том числе в Санкт-Петербурге, в основном по формальным признакам и их деление на так называемых федеральных и региональных льготников. Основополагающими для закупок лекарственных средств на бюджетные средства стали федеральные перечни с лимитированным обозначением их международных непатентованных и торговых названий.

Главной целью наших методических рекомендаций по-прежнему остается совершенствование системы лекарственного обеспечения льготных категорий граждан нашего города и оптимизация выбора и использования лекарственных средств при различных заболеваниях у людей. Сохранен основной подход к выбору и тактике назначения различных групп лекарственных средств и их отдельных представителей при разных нозологических формах, основанный на современных принципах доказательной медицины.

Прежней осталась методика и модель данных рекомендаций – по сути это таблицы, содержащие графы с указанием международных и торговых наименований препаратов, форм выпуска с дозировкой, средней суточной дозы, длительности лечения и примечаний. Выдержан тот же основной принцип выбора рекомендуемого лекарственного средства с учетом

оптимального соотношения их эффективности, безопасности и стоимости. Для удобства пользователя изменен формат издания. В создании настоящего документа принимали участие ведущие специалисты нашего города, включая клинических фармакологов.

Мы по-прежнему надеемся на конструктивную критику и какие-либо пожелания от наших коллег, чтобы данный документ максимально выполнил бы обозначенную выше главную цель своего предназначения и стал бы по-настоящему востребованным и полезным в каждодневном труде всех участников сферы лекарственного обращения и практического здравоохранения.

С уважением,
Главный клинический фармаколог
Комитета по Здравоохранению Санкт-Петербурга
А.К.Хаджидис.

ЛЕЧЕНИЕ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ВЗРОСЛЫХ

Клинический вариант	Наименования препаратов		Форма выпуска, дозировка	Средняя суточная доза	Длительность курса лечения	Примечание
	Международное	Торговые				
<u>Название заболевания: нервно-мышечные болезни</u>						
Миопатия	L-карнитин	L-карнитин	Табл., р-р 1 г	3г	1 год	
Миастения	Пиридостигмин	Калимин	Табл. 60 мг	240мг	Постоянно	
	Азатиоприн	Азатиоприн	Табл. 50 мг	150мг	2 года	
<u>Название заболевания: болезнь Паркинсона, синдром паркинсонизма</u>						
Ранние стадии (1, 2 стадии)	Пирибедил	Проноран	Табл. 50 мг	150мг	Постоянный прием	
	Леводопа	Наком	Табл. 125 мг	375мг	То же	
		Дуэллин-125	Табл. 100 мг	300мг	То же	
Поздние стадии (3, 4 стадии)	Пирибедил	Проноран	Табл. 50 мг	200мг	То же	
	Леводопа	Наком	Табл. 250 мг	500-750мг	То же	
		Дуэллин-250	Табл. 200 мг	600мг	То же	
<u>Название заболевания: рассеянный склероз</u>						
Рецидивирующе-ремиттирующий РС	Интерферон-бета- 1 b	Бетаферон	Фл. 8 млн МЕ	4 млн. МЕ (8 млн МЕ ч/д)	3 года	
	Интерферон-бета- 1 a	Ребиф	(250 мг)	22 мг (44 мг ч/день)	3 года	
Рецидивирующе-ремиттирующий первично и вторично-прогрессирующий РС	Глатимера ацетат	Копаксон	шприц 44 МГ	20мг	3 года	

ЛЕЧЕНИЕ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ

Клинический вариант	Наименования препаратов		Форма выпуска, дозировка	Средняя суточная доза	Длительность курса лечения	Примечание
	Международное	Торговые				
Название заболевания: детский церебральный паралич						
Детский церебральный паралич	Толперизон	Мидокалм	Табл. 0,05; 0,15	5 мг/кг	1-1,5 месяца 2-3 раза в год	
	Лиоресал	Баклофен	Табл. 0,01; 0,025	До 10 лет -0,75-2 мг/кг Больше 10 лет - 2,5 мг/кг	1 месяц, 3 раза в год	
	Тизанидин	Сирдалуд	Табл. 0,002; 0,004; 0,006	Старше 5 лет 1-4 мг	2, 3 недели 2-3 раза в год	
	Карбамазепин	Финлепсин	Табл. 0,2	1 табл. 2 раза/ день	При эпилептическом синдроме под контролем ЭЭГ	
	Вальпроат натрия	Депакин хроно	Табл. 0,3; 0,5	20-30 мг/кг 1-2 раза в день		
	Вальпроевая кислота	Конвулекс	Капс 0,15; 0,3; 0,5	3-6 мг/кг/сут на 2 приема		
	Холинальфосцерат	Глиатилин	Амп. 4 мл/1 000мг, капс. 400мг	1 амп., 1-2 кап.	1-2 недели, 30-40 дней, 2-3 раза в год	
	Циннаризин	Циннаризин	Табл. 0,025	1 табл. 3 раза в день	2-3 раза в год	
	Гомопантогеновая к-та	Пантогам	Табл. 250, 500 мг	1 табл. 3 раза в день	1-3 месяца	
Нервно-мышечные заболевания	Неостигмин метил-сульфат	Прозерин	Табл. 0,015	До 10 лет -0,001 на 1 год жизни. Старше 10 лет - 0,01 2-3 раза в день	постоянно	
	Пиридостигмин бромид	Калимин 60Н	Табл. 60 мг	30-60 мг в день; при прогрессировании миастении 60-180 мг 2-4 раза в сутки	постоянно	
	4- аминопиридан	Амиридин	Табл. - порошок	20-40 мг 3-6 раз в день макс, доза 180-200 мг	30-40 дней 3-4 раза в год	
	Преднизолон	Преднизолон	Табл. - 0,005	1-2 мг/кг в день	От неск. дней до неск. месяцев до получения лечебного эффекта	

	Дексаметазон	Дексаметазон	Табл. 500 мг	0,002-0,006 в день		
	Кальций Д3 Никомед	Кальций Д3 Никомед	В 1 табл. - кальций карбонат 1250 мг, холекальциферол - 200 МЕ	До 12 лет 1 табл. в день, старше 12 лет 1 табл. 2 раза в день	20-30 дней 2-3 раза в год	

ЛЕЧЕНИЯ ДИЗЕНТЕРИИ И ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ

Клинический вариант	Наименования препаратов		Форма выпуска, дозировка	Средняя суточная доза	Длительность курса лечения	Примечание	
	Международное	Торговое					
Название заболевания: дизентерия и острые кишечные инфекции							
Легкая степень тяжести	Производные нитрофуранов	Фуразолидон (Furazolidone)	В таблетках 1таб-50мгупак-20шт	400 мг	5-10 дней		
	Группа фторхинолонов	Офлоксацин (Ofloxacin)	В таблетках 1таб-200мг упак-10 шт	400 мг	5-7 дней		
		Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin)	В таблетках 1таб-250мг упак-10 шт	500 мг	5-7 дней		
	Бактисуптил	Бактисубтил (Bactisubtil)	В капсулах упак-20шт	4 капс.	14 дней		
	Хилак форте	Хилак форте	Во флаконах 1 флак – 100 мл	120 Капсль	14 дней		
Средняя степень тяжести	Группа фторхинолонов	Офлоксацин (Ofloxacin)	В таблетках 1таб-400мг упак-Юшт	800 мг	7-10 дней		
		Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin)	В таблетках 1таб-500мг упак-10 шт	1000 мг	7-10 дней		
	Котримазол	Бисептол	В таблетках 1таб-480мг упак-20шт.	560 мг	7 дней		
	Мезим-форте (Mezym-forте)	Мезим-форте (Mezym-forте)	В таблетках упак-20 шт.	3 табл.	12 дней		
	Бактисуптил	Бактисубтил (Bactisubtil)	В капсулах Упак-20шт	4 капс.	14-21 дней		

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ «В» И «С»

Фармакотерапевтическая группа	Наименования препаратов		Форма выпуска, дозировка	Средняя суточная доза	Длительность курса лечения	Примечание
	Международное	Торговое				
Название заболевания: вирусные гепатиты						
Гепатопротекторы	Урсодеоксихолевая кислота	Урсосан	Капсулы 1 капс-250 мг	5 капс-1250 мг	2-3 месяца	
		Фосфоглив	Капсулы В упак.50			
Желчегонные	Желчь+чеснок+крапива+активированный уголь	Аллохол	Таблетки в упак 10 табл в упак 50 табл	6 табл	1 неделя	
Средства влияющие на функции желудочно-кишечного тракта	Фосфолипиды	Эссенциале Н	Капсулы 1 капс-300 мг 1 упак-30 капс	900 мг	3 недели	
		Эсливер форте	Капсулы 1 капс-300 мг 1 упак-30капс	900 мг	3недели	
Противовирусные средства	Интерферон альфа-2а	Роферон-А	Ампулы 1 амп-3млнМЕ-0,5 мл 1 амп-18 млнМЕ 0,6 мл	1амп 2 раза в неделю	6 мес.	
	Рибаверин	Рибапег	Таблетки 1 табл-200 мг 1 упак-60 табл	800-1000	6 мес.	
		Рибаверин-Верте	Капсулы 1 кап-200 мг 1 упак-30 капс	800-1000	6 мес.	
		Рибамидил	Таблетки 1 таб-200 мг 1 упак-20 табл	800	6 мес.	

ЛЕЧЕНИЕ ОПОРТУНИСТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У БОЛЬНЫХ ВИЧ/СПИДОМ

Клинический вариант	Наименования препаратов		Форма выпуска, дозировка	Средняя суточная доза	Длительность курса лечения	Примечание
	Международное	Торговое				
Герпес-вирусная инфекция	Ацикловир	Ацикловир	Табл.200 мг	1200 мг	14 дней	
ЦМВ-инфекция	Ганцикловир	Цимевен	Таб. 0,5 и 1,0	3,0	21 день	
Пневмоцистная пневмония Профилактика заболевания и рецидива	Ко-тримаксозол	Бисептол	Таб 480 мг	480 мг	Без срока	Под контролем CD 4
Грибковые инфекции	Флуконазол	Дифлюкан	Капс. 50 и 100 мг	100 мг	30 дней	
		Микосисит	Капс. 50 и 100 мг	100 мг	30 дней	
		Дифлазон	Капс. 50 и 100 мг	100 мг	30 дней	
Токсоплазмоз	Ко-тримаксозол	Бисептол	Табл 480 мг	4 таб	21 день	
Саркома Калоши	Преднизолон	Преднизолон	Табл 5 мг	25 мг	30 дней	1-2 курса в год
Бактериальные инфекции	Азитромицин	Сумамед	Табл. 250мг	250	5 дней	2 курса
	Амоксицилин + клавулановая кислота	Медоклав	Таб 250 мг	1000 мг	7-10 дней	
		Аугментин суспензия	5 мл	20	7-10 дней	
	Доксициклин	Доксициклин - АКОС	Кап 100 мг	200 мг	7-10 дней	
Левифлоксацин	Таваник	Таб 250 мг	1000	7-10 дней		

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ТРАНСПЛАНТАЦИЮ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ

Клинический вариант	Наименования препаратов		Форма выпуска, дозировка	Средняя доза на цикл (мг)	Длительность цикла лечения	Примечание (среднее кол-во циклов)
	Международное	Торговые				
<u>Название заболевания: Пересадка органов и тканей.</u>						
Нормальное и осложненное течение посттрансплантационного периода	Циклоспорин	Сандиммун Неорал	Флаконы 50 мл, 100 мг/мл, капсулы 25, 50, 100 мг.	4 мг/кг.	Соответствует сроку функционирования пересаженного органа	Только эмульгированные формы циклоспорина.
Нормальное и осложненное течение посттрансплантационного периода	Такролимус	Програф	Капсулы 0,5 мг, 1 мг, 5 мг.	0,2 мг/кг	Соответствует сроку функционирования пересаженного органа	
Нормальное и осложненное течение посттрансплантационного периода	Метилпреднизолон	Метипред	Таблетки 4 мг.	24 мг	Соответствует сроку функционирования пересаженного органа	
		Медрол	Таблетки 4 мг.	24 мг		
Нормальное и осложненное течение посттрансплантационного периода	Преднизолон	Преднизолон	Таблетки 5 мг.	30 мг	Соответствует сроку функционирования пересаженного	
Нормальное и осложненное течение посттрансплантационного периода	Азатиоприн	Азатиоприн	Таблетки 50 мг.	50-200 мг.	Соответствует сроку функционирования пересаженного органа	
Нормальное и осложненное течение посттрансплантационного периода	Мофетиловая кислота	Майфортик	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 180 мг, 360 мг	1440 мг	Соответствует сроку функционирования пересаженного органа	
Герпес-вирусная инфекция	Ацикловир	Ацикловир	Таблетки 200 мг.	1200 мг	14 дней	
Профилактика и лечение ЦМВ-инфекции	Валганцикловир	Вальцит	Таблетки 450 мг	900 мг	70 дней	

Грибковая инфекция	Флуконазол	Дифлюкан Микосист Дифлазон	Капсулы 50 и 100 мг	100 мг	30 дней	
Бактериальная инфекция	Амоксициллин	Амоксициллин	Таблетки 250 мг Капсулы 250 мг	2000 мг	14 дней	
		Флемоксин солютаб	Растворимые таблетки 500 мг	2000 мг	14 дней	
	Амоксиклав	Амоксиклав	Таблетки 1000 мг	2000 мг	7-10 дней	
	Ципрофлоксацин	Ципрофлоксацин Ципринол	Таблетки 250 и 500 мг Таблетки 250 и 500 мг	1000 мг	10 дней	
	Азитромицин	Сумамед форте	Таблетки 500 мг	500 мг	3 дня	
	Кларитромицин	Клацид СР	Таблетки 500 мг	500 - 1000 мг	10 дней	
	Ко-тримоксазол	Ко-тримоксазол	Таблетки 480 мг	480 мг	60 - 90 дней	
	Метронидазол	Трихопол	Таблетки 250 мг	1500 мг	10 дней	Профилактика пневмоцистной инфекции после трансплантации
Инфекция мочевыводящих путей	Нитрофурантоин	Фурадонин	Таблетки 50 и 100 мг	300 мг	14 дней	
Задержка жидкости, терапия артериальной гипертензии	Фуросемид	Фуросемид	Таблетки 40 мг	40 мг	Соответствует сроку функционирования пересаженного органа	
	Гипотиазид	Гипотиазид	Таблетки 25 и 50 мг	25 мг		
	Триампур композитум	Триампур композитум	Таблетки	2 таб		
Артериальная гипертензия	Нифедипин	Коринфар Коринфар-ретард	Таблетки 10 мг Таблетки 20 мг	30 мг 40 мг	Пожизненно	Препарат и доза могут изменяться в зависимости от наличия или отсутствия эффекта
	Эналаприл	Энап Ренитек	Таблетки 5, 10 и 20 мг Таблетки 5, 10 и 20 мг	20 мг 20 мг	Пожизненно Пожизненно	
	Фозиноприл	Моноприл	Таблетки 10 мг	10 мг	Пожизненно	

	Лизиноприл	Диротон	Таблетки 10 мг	20 мг	Пожизненно	
	Атенолол	Атенолол	Таблетки 25 и 50 мг	100 мг	Пожизненно	
	Метопролол сукцинат	БеталокЗОК	Таблетки 25, 50, 100 мг	200 мг	Пожизненно	
	Бисопролол	Бисогамма	Таблетки 7,5 и 15 мг	5-10 мг	Пожизненно	
	Моэксиприл	Моэксиприл	Таблетки 5 мг	3,75-30 мг	Пожизненно	
	Амлодипин	Нормодипин, Кардилопин	Таблетки 5 мг	10 мг 10 мг	Пожизненно	
	Клофелин	Клофелин	Таблетки 0,15 мг	0,45 мг	Пожизненно	
«Коронарная болезнь»	Изосорбида динитрат	Нитросорбид	Таблетки 10 мг	50 мг	Пожизненно	При болях
		Кардикет	Таблетки 20, 40 и 60 мг.	80 мг		
	Нитроглицерин	Нитроглицерин	Таблетки 0,5 мг	при болях	Пожизненно	
	Изосорбид- мононитрат	Моночинкве-ретард	Капсулы 40 мг	40 мг	Пожизненно	
	Верапамил	Верапамил	Таблетки 40 и 80 мг	240мг	Пожизненно	
Нарушения обмена калия	Калия и магния аспарагинат	Панангин	Таблетки	3 таб.	10 дней	Ежемесячно
	Калия хлорид	Калий-нормин	Таблетки 1000 мг	2000 мг	10 дней	Ежемесячно
Облитерирующие заболевания сосудов	Пентоксифиллин	Пентилин Трентал	Таблетки 100 и 400 мг	1200 мг 1200 мг	30 дней 60 дней	Ежеквартально
	Варфарин	Варфарин Никомед	Таблетки 2,5 мг	7,5 мг	90 дней	
	Ацетилсалициловая кислота	Ацетилсалициловая кислота	Таблетки 500 мг	250 мг	Пожизненно	
Язвенно-эрозивные поражения ЖКТ,	Фамотидин	Фамотидин Квамател	Таблетки 20 и 40 мг	40 мг	28 дней	Возможно пожизненно
			Таблетки 20 и 40 мг	40 мг	28 дней	
Ферментативная недостаточность, хронический гепатит	Омепразол	Лосек Гастрозол Омез	Капсулы 20 и 40 мг	40 мг	28 дней	
			Капсулы 20 мг Капсулы 20 мг	40 мг		
	Алюминия фосфат	Фосфалюгель	Гель для приема внутрь, 16 г (пакет)	3 пакета	28 дней	

	Гель магния и алюминия	Альмагель А	Гель для приема внутрь фл. 70 мл.	1 м.л. х 3 раза	30 дней	
	Эссенциале	Эссенциале форте Н	Капсулы 300 мг	6 капсул 1800 мг	90 дней 90 дней	
	Панкреатин	Мезим форте 10000 ед.	Таблетки	4 таб.	60 дней	
Креон 10000 ед.		Капсулы	4 капс.			
Вторичная подагра	Аллопуринол	Аллопуринол	Таблетки 100 мг	200 мг	Пожизненно	
		Аллупол				
	Дротаверин	Но-шпа форте	Таблетки 80 мг	240 мг	При болях	
		Дротаверин	Таблетки 40 мг			
Осложнения со стороны опорно-двигательного аппарата	Альфакальцидол	Альфадол-Са	Капсулы	2 капсулы	120 дней	Содержит альфадол и карбонат кальция
	Нимесулид	Нимулид, Найз	Таблетки, Лингвальные таблетки 100 мг	200 мг	При болях	Менее выражено нефротоксическое действие
			Трансдермальный гель 1%	200 мг местно	При болях	

ЛЕЧЕНИЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ВЗРОСЛЫХ

Клинический вариант	Наименования препаратов		Форма выпуска, дозировка	Средняя суточная доза	Длительность курса лечения	Примечание
	Международное	Торговые				
<u>Название заболевания: аллергический ринит</u>						
Сезонный ринит и конъюнктивит (поллиноз)	Лоратадин	Кларитин Кларотадин Ломилан	Табл. 10 мг	10 мг	2 -3мес.	
	Беклометазон дипропионат	Насобек	Наз. спрей 50 мкг\доза, 200 доз	400мкг	2 – 3мес	
	Мометазон фуроат	Назонекс	Наз. спрей 50 мкг\доза 120 доз	400мкг	2 – 3мес	
Круглогодичный ринит	Лоратадин	Кларитин Кларотадин Ломилан	Табл. 10 мг	10 мг	12 мес.	
	Беклометазон дипропионат	Насобек	Наз. спрей 50 мкг\доза, 200 доз	400мкг	12 мес.	
	Мометазон фуроат	Назонекс	Наз. спрей 50 мкг\доза 120 доз	400мкг	12 мес.	
<u>Название заболевания: атопический дерматит</u>						
	Лоратадин	Кларитин, Кларотадин, Ломилан	Табл. 10 мг	10мг	6 месяцев	
	Мометазон фуроат	Элоком	0,1% крем, мазь, лосьон		7 дней	
	Гидрокортизона бутират	Локоид	0,1% крем, мазь		7 дней	
	Цетиризин	Цетиризин гексал	Табл. 10 мг	10мг	6 месяцев	

	Метилпреднизолон ацетат	Адвантан	0,1% эмульсия, крем, мазь жирная мазь		До 12 недель	
<u>Название заболевания: крапивница (острая, хроническая) и отек Квинке</u>						
	Лоратадин	Кларитин, Клоратадин, Лорагксал	Табл. 10 мг	10 мг	1 – 6 мес.	Длительность лечения зависит от остроты течения: при остром течении – короче, хроническом - длительнее
	Цетиризин	Цетиризин гексал	Табл. 10 мг	10 мг	1 – 6 мес.	
<u>Название заболевания: аллергическая бронхиальная астма</u>						
	Фенотерол	Беротек Н	Дозированный аэрозольный ингалятор, 100 мкг, 100 доз	До 5-6 ингаляций, по требованию	По требованию	Применение зависит от особенностей клинического течения
	Фенотерол Ипротропия бромид	Беродуал	Дозированный аэрозольный ингалятор: фенотерол 50мкг, ипротропия бромид 20 мкг, 300 доз	По требованию	По требованию	Применение зависит от особенностей клинического течения
	Сальметерол	Серевент-Аэрозоль	Дозированный аэрозольный ингалятор, 25 мкг, 60 доз и 120 доз	2 ингаляции		Применение зависит от особенностей клинического течения
	Формотерол	Форадил	Капсулы 12 мг, №24	2 ингаляции		Применение зависит от особенностей клинического течения

	Беклометазон дипропионат	Беклоджет	Дозированный аэрозольный ингалятор, 250 мкг, 200 доз	2 ингаляции	12 месяцев	
	Флютиказон пропионат, Сальметерол	Серетид мультидиск	Мульdisk флутиказон пропионат 250 и 500 мкг, сальметерол – 50 мкг, 60 доз	2 ингаляции	12 месяцев	
	Формотерол, будесонид	Симбикорт турбухалер	Формотерол 4,5 мкг будесонид 80 и 160 мкг, 60 доз	2 ингаляции	12 месяцев	
	Сальбутамол	Саламол ЭКО	Дозированный аэрозольный ингалятор 100мкг, 200 доз	По требованию		Применение зависит особенностей клинического течения
	Кромогликат натрия	Интал-аэрозоль	Дозированный аэрозольный ингалятор 1 мг, 5 мг	2 вдоха 4 раза в день	12 месяцев	
		Кромогексал	Раствор для ингаляций, 20 мг\2мл	4 раза в день	12 месяцев	
	Недокромил натрия	Тайлед – аэрозоль	Дозированный аэрозольный ингалятор 4мг	1 – 2 вдоха 3 – 4 раза в день	12 месяцев	
	Лоратадин	Кларитин, кларотадин, ломилан	Таблетки 10 мг	10 мг	12 месяцев	Только при внелегочных аллергических заболеваний

ЛЕЧЕНИЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ

Клинический вариант	Наименования препаратов		Форма выпуска, дозировка	Средняя доза на цикл (мг)	Длительность цикла лечения	Примечание (среднее кол-во циклов)
	Международное	Торговые				
Атопический дерматит	Цетиризин	Зиртек Парлазин	Таблетки 10 мг Капли для приема внутри 20 мл	2,5-10 мг	4-6 месяцев	Разрешен к применению с 6 месяцев
	Лоратадин	Кларитин Ломилан	Таблетки 10 мг Сироп 120 мл	5-10 мг (5-10 мл сиропа)	4-6 месяцев	Разрешен к применению с 2 лет
	Метилпреднизолон а ацепонат	Адвантан	0,1% эмульсия, крем, мазь, жирная мазь		По 7-14 дней, 3-4 раза в год	Разрешен к применению с 6 месяцев
	Пимекролимус	Элидел	1% крем		6-8 месяцев	Разрешен к применению с 3 месяцев
Аллергический ринит	Цетиризин	Зиртек Парлазин	Таблетки 10 мг Капли для приема внутри 20 мл	2,5-10 мг	4-6 месяцев	Разрешен к применению с 6 месяцев
	Лоратадин	Кларитин Ломилан Эролин	Таблетки 10 мг Сироп 120 мл	5-10 мг (5-10 мл сиропа)	4-6 месяцев	Разрешен к применению с 2 лет
	Беклометазон	Насобек	Назальный спрей 180 доз по 50 мкг	200-400 мкг/сут	15-30 дней, 4 курса в год	Разрешен к применению с 6 лет
	Кромоглициевая кислота	Кромогексал	Назальный спрей 15 мл	2 дозы 4 раза в день	2-4 месяца, 2 курса в год	Разрешен к применению с 2 лет

ЛЕЧЕНИЕ УРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Клинический вариант	Наименования препаратов		Форма выпуска, дозировка	Средняя суточная доза	Длительность курса лечения	Примечание
	Международное	Торговые				
Доброкачественная гиперплазия предстательной железы	Тамсулозин	Омник	0,4 мг №30	0,4	Постоянно	
	Альфузозин	Дальфаз	5 мг №56	5-10	Постоянно	
	Доксазозин	Камирен	2 мг №30	2-6	Постоянно	
	Доксазозин	Зоксон	4 мг № 30	4	Постоянно	
	Катетер Петцера	Катетер Петцера	№ 26-32	1 катетер в мес.	Постоянно	

ЛЕЧЕНИЕ РЕВМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Клинический вариант	Наименования препаратов		Форма выпуска, дозировка	Средняя доза на цикл	Длительность курса лечения	Примечание
	Международное	Торговые				
<u>Названия заболеваний : системная красная волчанка, дерматомиозит, спондилоартрит, ревматоидный артрит, ювенильный ревматоидный артрит, острая ревматическая лихорадка, хроническая ревматическая болезнь сердца, псориатический артрит.</u>						
Системная красная волчанка(350)	Преднизолон	Преднизолон	Таблетки по 5 мг. упаковка 100 таблеток	Острое течение 70 больных-40-60 мг/сут	год	
				Подострое течение -193 больных- 40-20 мг/сут	год	
				Хроническое течение - 88 больных 10 мг/сут	год	
Системная красная волчанка (175)	Циклофосфан	Циклофосфан	Флаконы по 200мг	По 200 мг 3 раза в недель/м	год	
Системная красная волчанка (20)	Метотрексат	Метотрексат	Таблетки по 5,0 мг. упаковка 100 таблеток	Острое течение - 20 больных - 20 мг/нед	год	
Системная красная волчанка(87)	Азатиоприн	Азатиоприн	Таблетки по 50 мг упаковка 50 таблеток	По 100 мг/сут	год	
Системная красная волчанка(90)	Метилпреднизолон	Солу-медрол	Флаконы по 1000 мг	1000 мг в/в Капельно	3 дня	
Системная красная волчанка(88)	Гидроксихлорохин	Делагил	Таблетки по 250 мг, упаковка 30 таблеток	88 больных по 2 таблетки/сут	год	

Дерматомиозит (53)	Преднизолон	Преднизолон	Таблетки по 5 мг. упаковка 100 таблеток	40 мг/сут	год	
Дерматомиозит (33)	Метотрексат	Метотрексат	Таблетки по 5,0 мг. упаковка 100 таблеток	20 мг/нед	год	
Дерматомиозит (10)	Метотрексат	Метотрексат	ампулы	40 мг в/в Капельно	№1	
Анкилозирующий спондилоартрит (Болезнь Бехтерева) (892)	Мелоксикам	Мовалис	Таблетки 15 мг в упаковке 20 таблеток	40 больных-15 мг/сут	год	
	Диклофенак	Ортофен	Таблетки по 25 мг в упаковке 50 таблеток	232 больных-6 таб. в день	год	
	Диклофенак	Диклофенак	Таблетки по 100 мг	520 больных 100 мг/сут	год	
	Сульфасалазин	Сульфасалазин	Таблетки по 500мг в упаковке 50 таблеток	500 больных- 3 г/сут		
	Метотрексат	Метотрексат	Таблетки по 2,5мг. упаковка 100 таблеток	392 больных по 7,5 мг/нед	год	
	Толнеризон	Мидокалм	Таблетки по 50 мг упаковка 50 табл	750 больных по 150 мг/сут	год	
Анкилозирующий спондилоартрит (Болезнь Бехтерева) (15 больных)	Сульфасалазин	Сульфасалазин	Таблетки по 500мг в упаковке 50 таблеток	15 больных по 2г/сут	год	
	Диклофенак	Ортофен	Таблетки по 0,25 мг в упаковке 50 таблеток	15 больных по 100 мг/сут	год	
Острая ревматическая лихорадка(105)	Бензатин бензилпенициллин	Экстенциллин	Флаконы по 2400000ед	105 больных 2400000ЕД 2 раза в месяц	104 инъекции в год	
	Эритромицин	Эритромицин	Таблетки по 0,25 мг в блистере 10	105 больных 1 г/сут-10 дней.	4 курса в год	

	Преднизолон	Преднизолон	Таблетки по 5 мг. упаковка 100 таблеток	15 больных -20 мг/сут 14 дней		
Хроническая ревматическая болезнь сердца(7409) (ХСН)	Дигоксин	Дигоксин	Таблетки по 0,25 мг в упаковке 50 таблеток	5438 больных - 1,5 таб/сут	год	
	Варфарин	Варфарин	Таблетки по 2,5 мг в упаковке 100 таблеток	415 больных по 3 таб/сут	год	
	Триампур	Триампур комполитум	таблетки по 50 в упаковке	6780 больных 1 таб/сут	год	
	Фуросумид	Фуросумид	Таблетки по 40 мг в упаковке 50таблеток	6780 больных 2 таблетки в неделю	год	
	Метопролол сукцинат	БеталокЗОК	Таблетки по 25, 50 и 100 мг	600 больных по 200 мг/сут	год	
Хроническая ревматическая болезнь сердца (дети) 15 больных	Бензатин бензилпенициллин	Бициллин 5	1 500 000 ЕД в флаконе	1 500 000 ЕД в 3 недели	13 инъекций в год	
Ревматоидный артрит (9819 больных)	Метотрексат	Метотрексат	Таблетки по 2,5мг. упаковка 100 таблеток	5300 больных по 7,5 мг/нед	год	
	Метотрексат	Метотрексат	ампулы	450 больных- 40 мг в/в Капельно однократно	№2 в год	
	Циклофосфан	Циклофосфан	Флаконы по 200 мг	812 больных по 200 мг 2 раза в неделю в/м	год	
	Азатиоприн	Азатиоприн	Таблетки по 50 мг упаковка 50 таблеток	812 больных по 100 мг/сут	год	
	Сульфасалазин	Сульфасалазин	Таблетки по 500мг в упаковке 50 таблеток	3890 больных-2 г/сут	год	

	Преднизолон	Преднизолон	Таблетки по 5 мг. упаковка 100 таблеток	715 больных -10 мг/сут	год	
	Гидроксихлорохин	Делагил	Таблетки по 250 мг , упаковка 30 таблеток	715 больных по 2 таблетки/сут	год	
	Циклоспорин-А	Панимун	Капсулы по 150 мг в упаковке 20 таблеток	215 больных 150 мг/сут	год	
	Дипроспан	Дипроспан	1 мл в ампуле в упаковке 3 ампулы	1300 больных 1 мл в/суставно 1 раз в 3 месяца	год	
	Метилпреднизолон	Солу-медрол	Флаконы по 1000 мг	1300 больных 1000 мг в/в Капельно	3 дня	
	Д-пеницилламин	купренил	Табл по 250 мг во флаконе 50 таблеток	300 больных 500 мг/сут	год	
	Диклофенак	Диклофенак	Таблетки по 100 мг	7520 больных 100 мг/сут	год	
	Нимесулид	Нимулид		620 больных	год	
Ювенильный ревматоидный артрит (150)	Дипроспан	Дипроспан	1 мл в ампуле в упаковке 3 ампулы	60 больных 1 мл в/суставно 1 раз в 3 месяца	год	
	Преднизолон	Преднизолон	Таблетки по 5 мг. упаковка 100 таблеток	150 больных -10 мг/сут	год	
	Метотрексат	Метотрексат	Таблетки по 2,5мг. упаковка 100 таблеток	90 больных по 7,5 мг/нед	год	
Псориатический артрит (346 больных)	Метотрексат	Метотрексат	Таблетки по 5мг. упаковка 100 таблеток	180 больных по 15 мг/нед	год	

	Сульфасалазин	Сульфасалазин	Таблетки по 500мг в упаковке 50 таблеток	156 больных- 2 г/сут	год	
	Циклоспорин-А	Панимун	Капсулы по 150 мг в упаковке 20 таблеток	3 5 больных 150 мг/сут	год	
Системная склеродермия (135)	Пеницилламин	Купренил	Табл по 250 мг в упаковке 100 табл. таблеток	70 больных 500 мг/сут	год	
	Колхицин	Колхикум	Драже по 500 мкг, в упаковке 20	50 больных по 500 мкг/сут	год	
	Преднизолон	Преднизолон	Таблетки по 5 мг. упаковка 100таблеток	70 больных -10 мг/сут	год	

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Клинический вариант	Наименования препаратов		Форма выпуска, дозировка	Средняя суточная доза (мг)	Длительность лечения	Примечание
	Международное	Торговые				
<u>Название заболевания: острый инфаркт миокарда</u>						
1. Не осложненный	Эналаприл	Ренитек	Таб. 5 мг, 10 мг, 20 мг		6 мес.	Все таблетки делимые
		Энап				
	Периндоприл	Престариум	Таб. 4 мг.	4 мг	6 мес.	
	Рамиприл	Хартил	таб. 5 мг, 10 мг	10 мг	6 мес.	
	Моэксиприл	Моэкс	таб. 7,5 мг, 15 мг	15 мг	6 мес.	
	Атенолол	Атенолол	таб. 50мг, 100мг	100 мг	6 мес.	
	Метопролол	Эгилок	таб. 100мг	50 мг	6 мес.	
	Метопролол-сукцинат	Беталок-ЗОК	таб. 25,50, 100 мг	50мг	6 мес.	
	Бетаксолол	Локрен	таб. 20 мг	20 мг.	6 мес.	
	Симвастатин	Симгал	таб. 20мг	20 мг	6 мес.	
		Вазилип	таб. 10мг	20 мг.	6 мес.	
		Симвакард	таб. 20мг	20 мг	6 мес.	
		Зокор	таб. 10мг 20 мг	10 мг	6 мес.	
	Розувастатин	Крестор	таб. 10мг 20 мг №28	10 мг.	6 мес.	
	Фенофибрат	Липантил 200М	таб. 200 мг	200 мг.	6 мес.	
	Изосорбид динитрат или изосорбид 5-мононитрат	Нитросорбид	таб. 10 мг. 20 мг	40 мг	6 мес.	
Кардикет		таб. 40 мг	80 мг	6 мес.		

		Моночинкве	таб. 40 мг	80 мг	6 мес.	
		Моносан	таб.20 мг. 40 мг	40 мг	6 мес.	
		Моночинкве ретард	капс.50 мг	50 мг	6 мес.	
		Пектрол	таб. 40 мг, 60 мг	80 мг	6 мес.	
		Эфокс-лонг	таб. 50 мг	50 мг		
2. Осложненный сердечной недостаточностью	Изосорбид динитрат или изосорбид 5-мононитрат	Нитросорбид	таб. 10 мг.	40 мг	6 мес.	
		Кардикет	таб.40 мг	80 мг	6 мес.	
		Моночинкве	таб. 40 мг	80 мг	6 мес.	
		Моносан	таб.20 мг. 40 мг	40 мг	6 мес.	
		Моночинкве ретард	капс.50 мг	50 мг	6 мес.	
		Пектрол	таб. 40 мг, 60 мг	80 мг	6 мес.	
		Эфокс-лонг	таб. 50 мг	50 мг	6 мес.	Делимые таблетки
3. Осложненный сердечной недостаточностью	Дигоксин	Дигоксин	таб. 0,25 мг	0,125 мг	6 мес.	
	Фуросемид	Фуросемид	таб. 40 мг	40 мг	6 мес.	
	Метопролол-сукцинат	Беталок-ЗОК	таб. 25, 50,100 мг	50 мг	6 мес.	
	Карведилол	Акридилол	таб. 25 мг	12,5 мг	6 мес.	
		Толлилол	таб. 25 мг	12,5 мг	6 мес.	
	Бисопролол	Конкор	таб. 2.5 мг, 5 мг	5 мг	6 мес.	
4. Осложненный фибрилляцией желудочков, желудочковой тахикардией, др.	Амиодарон	Кордарон	таб. 200 мг	400 мг	6 мес.	
		Амиокардин	таб. 200 мг	400 мг	6 мес.	

жизнеугрожающими нарушениями ритма	Соталол	Сотагексал	таб.160 мг	80 мг	6 мес.	
		Соталекс	таб, 160 мг	80 мг	6 мес.	
5. При наличии артериальной гипертензии	Амлодипин	Норваск	таб. 5 мг, 10 мг	5 мг	6 мес.	Таблетки делимые
		Нормодипин	таб. 5 мг, 10 мг	5 мг	6 мес.	
		Кардилолин	таб. 5 мг, 10 мг	5 мг	6 мес.	
	Нифедипин-ретард	Кордафлекс-ретард	таб. 20 мг		6 мес.	
	Индапамид	Арифон-ретард	таб. 1,5 мг	1,5 мг	6 мес.	
	Гидрохлортиазид	Гипотиазид	таб.25 мг 50 мг, 100мг	25 мг	6 мес.	
6. Осложненный тромбоэмболиями, мерцательной аритмией	Варфарин	Варфарин	таб. 2.5 мг	5 мг	6 мес.	
7. ОИМ + коронаропластика, стентирование или АКШ	Клопидогрель	Плавикс	таб. 75 мг	75 мг	6 мес.	
8. Протезирование клапанов сердца	Варфарин	Варфарин	таб. 2.5 мг	5 мг	пожизненно	

Примечания.

1. Больным со всеми клиническими вариантами ОИМ показано назначение (при отсутствии противопоказаний) всех категорий препаратов, перечисленных в п.1
2. При непереносимости ингибиторов АПФ показано лечение одним из антагонистов рецепторов АТ1 - кандесартаном (Атаканд), ирбесартаном (Апровель), эпросартаном (Теветен), лозартаном (Лозап, Козаар)
3. К п..5: контроль АД может обеспечиваться как за счет увеличения доз препаратов, перечисленных в п.1, так и за счет добавления антигипертензивных средств, указанных в данной рубрике.

ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ

Клинический вариант	Наименования препаратов		Форма выпуска, дозировка	Средняя суточная доза	Длительность курса лечения	Примечание
	Международное	Торговое				
Название заболевания: муковисцидоз						
Легкое течение	Дорназа-альфа	Пульмозим	амп., 2,5 мг	2,5 мг	1 мес. 6 раз/год	При поражении легких
	N-ацетилцистеин	Флуимуцил	гранулят, 200 мгамп., 3 мл	600 мг2 амп	постоянно1 мес. 3 раз/год	При поражении легких
	Панкреатин	Креон	капс., 10 000 Ед	30000-150 000 Ед	постоянно	При недостаточности поджелудочной железы
	Кларитромицин	Клацид	табл., 250 мг, 500 мг	500-1000 мг	3 мес. 1-2 раза/год	При поражении легких
	Амоксициллин клавуланат	Амоксиклав	табл., 375 мг	500-1000 мг	2 нед. 2-3 раза/год	При поражении легких S.aug.
	Левифлоксацин	Таваник	таб, 500 мг.	1 гр.	2 нед. 2-3 раза/год	При поражении легких S.aug.
	Урсодеоксихолевая кислота	Урсофальк	капс., 250 мг	250-500 мг	1 мес. 4 раз/год	При поражении гепатобилиарной системы.
	Сальметерола ксинафоат, флютиказона пропионат	Серетид	50/250 мкг, 60 доз, доз. инг. Или порошок	500 мкг	постоянно	При наличии гиперреактивности бронхов
	Будесонид	Пульмикорт	0,25 мг/мл, 0,5 мг/мл, №20, небулы	500 мкг	в обострение	При выраженном БОС и/или гиперреактивности бронхов
	Формотерол +Будесонид	Симбикорт	4,5/80 мкг, 4,5/160мкг, 60 доз, поршок д/инг.	2 дозы	постоянно	При наличии гиперреактивности бронхов
Сальбутамол	Сальгим	10 мл 0,1% р-ра для ингаляций	4 мл	В обострение или постоянно в качестве базисной терапии	При выраженном БОС и/или гиперреактивности бронхов	

	Ипратропия бромид + Фенотерол	Беродуал	20 мл р-ра для ингаляций	1,5-3 мл	В обострение или постоянно в качестве базисной терапии	При выраженном БОС и/или гиперреактивности bronхов
	Домперидон	Мотилиум	Таб., 10 мг.	30 мг	Постоянно	При гастроэзофагеальном рефлюксе
	Бифидумбактерин	Бифидумбактерин	Флак. 5 доз	15 доз	Постоянно	Всем больным
Среднетяжелое течение	Дорназа-альфа	Пульмозим	амп., 2,5 мг	2,5 мг	постоянно	При поражении легких
	N-ацетилцистеин	Флуимуцил	гранулят, 200 мгамп., 3 мл	600 мг2 амп	постоянно 1 мес. 4 раз/год	При поражении легких
	Панкреатин	Креон	капс., 10 000 Ед	30000-150000 Ед	постоянно	При недостаточности поджелудочной железы
	Кларитромицин	Клацид	табл., 250 мг, 500 мг	500-1000 мг	3 мес. 2-3 раза/год	При поражении легких
	Амоксициллин клавуланат	Аугментин	табл., 375 мг	500-1000 мг	2 нед. 3-4 раза/год	При поражении легких S.aur.
	Ципрофлоксацин	Ципролет	табл., 250 мг, 500 мг	500-1000 мг	2 нед. 3-4 раза/год	При поражении легких Ps.aeruginosa
	Меропенем	Меронем	флак. для в/в инъек., 1 гр.	3 гр	2 нед 2-3 раза/год	При поражении легких Ps.aeruginosa
	Цефтазидим	Фортум	флак. для в/в инъек., 1 гр.	4 гр	2 нед. 3 раза/год	При поражении легких Ps.aeruginosa
	Левифлоксацин	Таваник	таб., 500 мг.	1 гр.	2 нед. 3 раза/год	При поражении легких S.aur.
	Урсодексихолевая кислота	Урсофальк	капс., 250 мг	250-500 мг	1 мес. 6 раз/год	При поражении гепатобилиарной
	Сальметерола ксинафоат, флюти- казона пропионат	Серетид	50/250 мкг, 60 доз, доз. инг. Или порошок	500-1000 мкг	постоянно	При наличии гиперреактивности bronхов
		Будесонид	Пульмикорт	0,25 мг/мл, 0,5 мг/мл, №20, небулы	500-1000 мкг	в обострение

	Формотерол + Будесонид	Симбикорт	4,5/80 мкг, 4,5/160 мкг, 60 доз, порошок д/инг.	2-4 дозы	постоянно	При наличии гиперреактивности бронхов
	Сальбутамол	Сальгим	10 мл 0,1% р-ра для ингаляций	4-8 мл	В обострение или постоянно в качестве базисной терапии	При выраженном БОС и/или гиперреактивности бронхов
	Ипратропия бромид + Фенотерол	Беродуал	20 мл р-ра для ингаляций	1,5-3 мл	В обострение или постоянно в качестве базисной терапии	При выраженном БОС и/или гиперреактивности бронхов
	Домперидон	Мотилиум	Таб., 10 мг.	40 мг	Постоянно	При гастроэзофагеальном рефлюксе
	Бифидумбактерин	Бифидумбактерин	Флак. 5 доз	20 доз	Постоянно	Всем больным
Тяжелое течение	Дорназа-альфа	Пульмозим	амп., 2,5 мг	2,5 мг	постоянно	При поражении легких
	N-ацетилцистеин	Флуимуцил	гранулят, 200 мг амп., 3 мл	600 мг 2 амп	постоянно 1 мес. 6 раз/год	При поражении легких
	Панкреатин	Креон	капс., 10 000 Ед	30000-150000 Ед	постоянно	При недостаточности поджелудочной железы
	Кларитромицин	Клацид	табл., 250 мг, 500 мг	500-1000 мг	3 мес. 3 раза/год	При поражении легких
	Амоксициллин клавуланат	Аугментин	табл., 375 мг	500-1000 мг	2 нед. 3 раза/год	При поражении легких S.aug.
	Ципрофлоксацин	Ципролет	табл., 250 мг, 500 мг	500-1000 мг	2 нед. 3 раза/год	При поражении легких Ps.aeruginosa
	Меропенем	Меронем	флак. для в/в инъек., 1 гр.	3 гр	2 нед 2-3 раза/год	При поражении легких Ps.aeruginosa
	Цефтазидим	Фортум	флак. для в/в инъек., 1 гр.	4 гр	2 нед. 3 раза/год	При поражении легких Ps.aeruginosa
Левифлоксацин	Таваник	таб., 500 мг.	1 гр.	2 нед. 3 раза/год	При поражении легких S.aug.	

	Урсodeоксиколовая кислота	Урсофальк	капс., 250 мг	250-500 мг	1 мес. 6 раз/год	При поражении гепатобилиарной системы.
	Сальметерола ксинафоат, флютиказона пропионат	Серетид	50/250 мкг, 60 доз, доз. инг. Или порошок	1000 мкг	постоянно	При наличии гиперреактивности бронхов
	Будесонид	Пульмикорт	0,25 мг/мл, 0,5 мг/мл, №20, небулы	500-1000 мкг	в обострение	При выраженном БОС и/или гиперреактивности бронхов
	Формотерол +Будесонид	Симбикорт	4,5/80 мкг, 4,5/160мкг, 60 доз, поршок д/инг.	2-4 дозы	постоянно	При наличии гиперреактивности бронхов
	Сальбутамол	Сальгим	10 мл 0,1% р-ра для ингаляций	4-8 мл	В обострение или постоянно в качестве базисной терапии	При выраженном БОС и/или гиперреактивности бронхов
	Ипратропия бромид + Фенотерол	Беродуал	20 мл р-ра для ингаляций	1,5-3 мл	В обострение или постоянно в качестве базисной терапии	При выраженном БОС и/или гиперреактивности бронхов
	Домперидон	Мотилиум	Таб., 10 мг.	40 мг	Постоянно	При гастроэзофагеальном рефлюксе
	Бифидумбактерин	Бифидумбактерин	Флак., 5 доз	25 доз	Постоянно	Всем больным
Клинический вариант	Наименования препаратов		Форма выпуска, дозировка	Средняя суточная доза	Длительность курса	Примечания
	международное	торговое				
<u>Название заболевания: Бронхиальная астма у взрослых</u>						
Бронхиальная астма легкого персистирующего течения	Фенотерол	Беротек Н	100 мкг/доза, 200 доз, 10 мл, доз. инг.	100 - 200 мкг	ситуационно	

	Сальбутамол	Саламол ЭКО	100мкг/доза 200 доз, доз. инг.	100 - 200 мкг	ситуационно	
		Сальбен	200мкг/доза, 200 доз	200-400 мкг		
	Формотерол	Окис	4,5 мкг, 9 мкг, 60 доз, порош. инг.	18 мкг	При обострении, или наличии симптомов бронхоспазма	
		Форадил	Капс.по 12 мкг; 30 капсул в упак.	24 мкг	При обострении	
	Ипратропиум бромид	Атровент	20,0 мкг, 300 доз, доз. инг.	120-160 мкг	в обострение или при симптомах	Как альтернатива инг. β_2 -агонистов
	Беклометазон дипропионат	Беклоджет	250 мкг/200 доз, доз. инг.	500 мкг	при обострении или профилактически 3 мес	Для больных с вяжельым течением и пожилых
		Кленил				
Беклазон ЭКО легкое дыхание						
Бронхиальная астма средней степени тяжести	Фенотерол	Беротек Н	100 мкг/доза 200 доз, 10 мл, доз. инг.	100 - 200 мкг	ситуационно	
	Сальбутамол	Сальбен	200мкг/доза 200 доз,	400 мкг	ситуационно	
		Саламол ЭКО	100мкг/доза 200 доз, доз. инг.	100 - 300 мкг	ситуационно	
		Сальтос	Табл.по 7,23 мг, № 30	3 табл./сут	постоянно или при обострении	Назначается при невозможности использования ДИ, а так же при ночных симптомах
	Формотерол	Окис	9 мкг/доза, 60 доз, порош. инг.	18 мкг	постоянно или при обострении	Как дополнение при нестабильном течении
		Форадил	12 мкг/доза, 30 кап., порош. инг.	24 мкг	постоянно или при обострении	Как дополнение при нестабильном течении

	Сальметерол	Серевент	25 мкг/доза, 60 доз, доз. или порош. инг.	50 мкг	постоянно или при обострении	Как дополнение при нестабильном течении
	Ипратропиум бромид	Атровент	20,0 мкг, 300 доз доз. инг.	120 -160 мкг	при симптомах или при обострении	Как альтернатива инг. в ₂ -агонистов
	Ипратропиум бромид, фенотерол	Беродуал Н	Фенотерол 50 мкг+ ипратропия бромид 21 мкг в 1 дозе ; 200 доз, доз. инг.	2-6 доз	при симптомах или в обострение	Как альтернатива инг. в ₂ -агонистов
	Беклометазон дипропионат	Кленил, Беклоджет	250 мкг/200 доз, доз. инг.	1000 мкг	Длительно, месяцами	
	Беклометазон дипропионат	Беклазон ЭКО Легкое дыхание	250 мкг/200 доз, доз. инг.	1000 мкг	Длительно, месяцами	Пациентам, не способным координировать вдох и активацию ДИ (пожилые)
	Будесонид	Пульмикорт	0,5 мг/мл №20 небулы	1000 мкг	При ухудшении состояния	
		Пульмикорт турбухалер	200 мкг порош. инг	1000 мкг	Длительно, месяцами	
		Бенакорт	200 мкг, 200 доз, порош. инг	500-1000 мкг	Длительно, месяцами	
	Фенотерол + Будесонид	Симбикорт	4,5/160мкг, 60 доз, порош. инг.	9/320 мкг	постоянно	при нестабильном течении
	Фенотерол + Будесонид	Симбикорт	4,5/160мкг, 60 дозпорош. инг.	9/320 мкг	постоянно	при нестабильном течении
Бронхиальная астма тяжелой степени тяжести	Фенотерол	Беротек Н	100 мкг/доза 200 доз, 10 мл, доз. инг.	100-200 мкг	ситуационно	
	Сальбутамол	Сальбен	200 мкг/доза 200 доз,	400 мкг	ситуационно	
		Саламол ЭКО	100 мкг/доза 200 доз, доз. инг.	100-400 мкг	ситуационно	

		Сальтос	7,23 г, таб. № 30	3-4 т/сут	постоянно или при обострении	Невозможность использования ДИ
Формотерол	Оксис	9 мкг, 60 доз, порош. инг.	18 мкг	18 мкг	постоянно или по требованию	Как дополнение при нестабильном течении
	Форадил	12 мкг/доза, 30 кап., порош. инг.	24 мкг	24 мкг	постоянно	Как дополнение при нестабильном течении
Сальметерол	Серевент	25 мкг, 60 доз, доз, инг	50 мкг	50 мкг	постоянно	Как дополнение при нестабильном течении
Ипратропиум бромид	Атровент	20,0 мкг, 300 доз, доз. инг.	120-160 мкг	120-160 мкг	при симптомах или при обострении	Как альтернатива инг. в ₂ -агонистов
Ипратропиум бромид, фенотерол	Беродуал Н	Фенотерол 50 мкг+ипратропия бромид 21 мкг в 1 дозе. 200 доз; доз. инг.	2-6 доз	2-6 доз	при обострении или при симптомах	Как альтернатива инг. в ₂ -агонистов
Беклометазон дипропионат	Кленил Беклоджет	250 мкг/200 доз., доз.ингалятор	1000-1500 мкг	1000-1500 мкг	постоянно	
Беклометазон дипропионат	Беклазон ЭКО Легкое дыхание	250 мкг/200 доз; доз. инг.	1500 мкг	1500 мкг	постоянно	Пациентам, не способным координировать вдох и активацию ДИ (пожилые)
Будесонид	Пульмикорт	0,5 мг/мл №20 небулы	1000 мкг	1000 мкг	При ухудшении состояния	
	Пульмикорт турбухалер	200 мкг порош. инг	1000 мкг	1000 мкг	Длительно, месяцами	
	Бенакорт	200 мкг, 200 доз, порош. инг	1000-1200 мкг	1000-1200 мкг	Длительно, месяцами	
Сальметерола ксинафоат, флутиказона пропионат	Серетид	50 мкг сальметерола/ 250 мкг флутиказона, 60 доз, доз. инг.	500 мкг	500 мкг	При обострении, поддерживающая терапия	
Фенотерол + Будесонид	Симбикорт	4,5/160мкг, 60 доз, доз. инг.	18/640 мкг	18/640 мкг	При обострении, поддерживающая терапия	

Бронхиальная астма обострение	Будесонид	Пульмикорт	0,25 мг/мл, №20, небулы	1000 мкг	при обострении 10 ингаляций	
	Фенотерол + Будесонид	Симбикорт	4,5/160мкг, 60 доз, доз. инг.	18/640 мкг	при обострении	Возможно, как дополнение к базисной терапии в обострение
	Сальметерола ксинафоат, флутиказона пропионат	Серетид	50 мкг сальметерола/ 250 мкг флутиказона	500 мкг	при обострении	Возможно, как дополнение к базисной терапии в обострение

Название заболевания: Хроническая обструктивная болезнь легких

Стадия III (30% ≤ ОФВ ₁ < 50% от должных значений; ОФВ ₁ /ФЖЕЛ < 70%) (Тяжелое течение)	Бронхоспазмолитические препараты					
	Тиотропиум бромид	Спирива	Капсулы по 18 мкг. 10 капсул. Ингалятор HandiHaler	1 раз в сутки	Базисная постоянная терапия	
	Ипратропиум бромид	Атровент	ДАИ: 20 мкг/доза, 300 доз	120-160 мкг/сут	Базисная постоянная терапия	
	Ипратропиум бромид, фенотерол	Беродуал Н	ДАИ: 21/50 мкг, 200 доз	до 8 доз/сут	Базисная постоянная терапия	
	Сальметерол	Серевент	ДАИ: 25 мкг, 60 доз	50-100 мкг/сут	Базисная постоянная терапия в сочетании с холинолитиком	
	Формотерол	Форадил Аэролайзер	12 мкг, 30 капсул в комплекте с Аэролайзером	24-48 мкг/сут	Базисная постоянная терапия в сочетании с холинолитиком	
		Окис Турбухалер	4,5 мкг и 9 мкг в комплекте с турбухалером, 60 доз	9-18 мкг/сут	Базисная постоянная терапия в сочетании с холинолитиком	
	Фенотерол	Беротек Н	ДАИ: 100мкг/доза 200 доз	Не более 600 мкг/сут	В сочетании с холинолитиками	

Сальбутамол	Сальбен	Порошок д/ингаляций: 200 мкг, 200 доз Доставка с помощью циклохалера.	800-1600 мкг/сут	В сочетании с холинолитиками	
	Саламол ЭКО	ДАИ: 100мкг/доза, 200 доз	Не более 600-800 мкг/сут		
	Сальтос	7,23 мг, таб. № 30	1-2 таб		
Ингаляционные кортикостероиды					
Беклометазона дипропионат	БеклоджетБеклазон ЭКО Легкое дыхание	ДАИ: 250 мкг,	500-1000 мкг/сут	Регулярное лечение: при 50% < ОФВ ₁ и положительном влиянии ИГКС на данные спирометрии, а также при повторяющихся обострениях, требующих лечения антибиотиками или системными ГКС	
	Пульмикорт	250 мкг/кг, 500 мг/кг небулы по 2 мл №20		Для больных с тяжелым течением, при обострении	
	Пульмикорт турбухалер	200 мкг порош. инг	1000 мкг/сут		
	Бенакорт	200 мкг, 200 доз, порош. инг			
Комбинированные препараты					
Будесонид + формотерол	Симбикорт	80/4,5 мкг 160/4,5 мкг	2 ингаляции в сутки	Длительная поддерживающая терапия	
Сальметерол + флутиказона пропионат	Серетид	25/125 и 25/250; 120 доз.	2 ингаляции в сутки	Длительная поддерживающая терапия	
Противовоспалительные и муколитические препараты					
Фенспирид	Эреспал	Таб. 80 мг. №30	160 мг/сут	2-6 мес.	
Ацетилцистеин	Флуимуцил	Табл.по 600 мг	600 мг/сут	Длительная поддерживающая терапия	

Бронхоспазмолитические препараты:						
Стадия IV (ОФВ ₁ < 30% от должных значений или ОФВ ₁ < 50% плюс дыхательная недостаточность либо клинические симптомы легочного сердца;	Тиотропиум бромид	Спирива	Капсулы по 18 мкг. 10 капсул. Ингалятор HandiHaler	1 раз в сутки	Базисная постоянная терапия	
	Ипратропиум бромид, фенотерол	Беродуал Н	ДАИ: 21/50 мкг, 200 доз	до 8 доз/сут	Базисная постоянная терапия	
	Сальметерол	Серевент	ДАИ: 25 мкг, 60 доз	100-200 мкг/сут	Базисная постоянная терапия в сочетании с холинолитиком	
	Сальметерол	Серевент	Порошок д/ингаляций: 50 мкг; в ротадиске 4 дозы, в коробке 15 штук. Доставка с помощью дискхалера	100-200 мкг/сут	Базисная постоянная терапия в сочетании с холинолитиком	
	Формотерол	Окис Турбухалер	4,5 мкг и 9 мкг в комплекте с турбухалером, 60 доз	9-18 мкг/сут	Базисная постоянная терапия в сочетании с холинолитиком	
		Форадил Аэролайзер	12 мкг, 30 капсул в комплекте с Аэролайзером	24-48 мкг/сут	Базисная постоянная терапия в сочетании с холинолитиком	
ОФВ ₁ /ФЖЕЛ < 70%) (Крайне тяжелое течение)	Ингаляционные глюкокортикостероиды (ИГКС):					
Беклометазона дипропионат	Беклазон ЭКО Беклоджет Беклазон Эко Легкое дыхание	ДАИ: 100 и 250 мкг,	500-1000 мкг/сут	Регулярное лечение: при 50% < ОФВ ₁ и положительном влиянии ИГКС на		

	Будесонид	Пульмикорт	250 мкг/мл, 500 мкг/мл небулы по 2мл, №20	500-1000 мкг/сут	данные спирометрии, а также при повторяющихся обострениях, требующих лечения антибиотиками или системными ГКС		
		Пульмикорт турбухалер	200 мкг; 200 доз.	Порошк.инг. 500-1000 мкг/сут	Длительная поддерживающая терапия		
		Бенакорт					
	Комбинированные препараты						
	Будесонид + формотерол	Симбикорт	80/4,5 мкг 160/4,5 мкг	2 ингаляции в сутки	Длительная поддерживающая терапия		
	Сальметерол + флутиказона пропионат	Серетид	25/125 и 25/250; 120 доз.	2 ингаляции в сутки	Длительная поддерживающая терапия		
	Противовоспалительные и муколитические препараты						
	Фенспирид	Эреспал	Таб. 80 мг. №30	160 мг/сут	2-6 мес.		
	Ацетилцистеин	Флуимуцил	Табл.по 600 мг	600 мг/сут	Длительная поддерживающая терапия		
	Название заболевания: Бронхиальная астма у детей						
Бронхиальная астма	Кромоглицеиновая кислота	Кромогексал-небулы	Небулы 2 мл по 20 мг, 50 шт	2 мл 4 раза в сут (800 мг/сут)	2-3 месяца, 3 курса в год	Разрешен к применению с 1 месяца	
	Недокромил натрия	Тайлед, тайлед-минт	Дозирующий аэрозоль, 2 мг, 112 ДОЗ	2 дозы 2 раза в день	2-3 месяца, 3 курса в год	Разрешен к применению с 4 лет	

	Беклометазон	Беклазон ЭКО	Дозирующий аэрозоль по 100 и 250 мкг, 200 доз	400-800 мкг/сут	3-5 месяцев	Ограничений по возрасту нет
		Беклазон ЭКО Легкое дыхание	Дозирующий аэрозоль по 100 и 200 мкг, 200 доз			
		Бекотид	Дозирующий аэрозоль по 50 мкг, 200 доз			
	Флутиказон	Фликсотид	Дозирующий аэрозоль по 125 и 250 мкг, 60 доз	500 мкг/сут	3-5 месяцев	Разрешен к применению с 4 лет
			Порошок для ингаляций в ротадисках по 50,100, 250 мкг			
	Будесонид	Пульмикорт	Суспензия для небулайзера, небулы 2 мл, по 250 мкг/мл	1 раз в день	15-30 дней, 2-3 курса в год	Разрешен к применению с 6 месяцев
			Турбухалер по 100 и 200 мкг, 200 доз	200-600 мкг/сут	3-5 месяцев	Разрешен к применению с 4 лет
	Будесонид+формотерол	Симбикорт	Турбухалер по 80/4,5 мкг и по 160/4,5 мкг, 120 доз	По 1-2 дозе 2 раза в день	3 месяца	Разрешен к применению с 6 лет
Флутиказон+сальметерол	Серетид-мультидиск	Порошок для ингаляций по 100/50 мкг и по 250/50 мкг, 60 доз	По 1-2 дозе 2 раза в день	3 месяца	Разрешен к применению с 4 лет	
Сальбутамол	Саламол ЭКО	Дозирующий аэрозоль по 100 мкг,	По 1 дозе 3 раза в день	15 дней, 4 курса в год	Ограничений по возрасту нет	

		Вентолин	120 доз			
		Саламол ЭКО Легкое дыхание				
		Сальбутамол				
	Сальметерол	Серевент	Дозирующий аэрозоль по 25 мкг, 120 доз	По 1 дозе 2 раза в день	15-30 дней, 2-3 курса в год	Разрешен к применению с 4 лет
	Формотерол	Окисис турбухалер	Порошок для ингаляций по 4,5 мкг, 60 доз	По 1 дозе 2 раза в день	15-30 дней, 2-3 курса в год	Разрешен к применению с 5 лет
		Форадил	Порошок для ингаляций по 12 мкг	По 1 дозе 2 раза в день	15-30 дней, 2-3 курса в год	Разрешен к применению с 4 лет

ЛЕЧЕНИЕ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Клинический вариант	Наименования препаратов		Форма выпуска, дозировка	Средняя суточная доза	Длительность курса лечения	Примечание
	Международное	Торговые				
Название заболевания: ихтиоз (на Д-учете 20 больных)						
Формы: врожденная; ихтиозиформная; эритро-дермическая	Ацитретин	Неотигазон	Табл. 0,025	4 табл.	4 месяца	
Лечение всех клинических вариантов идентичное.						
Название заболевания: системный микоз (на Д-учете 50 больных)						
Универсальный онихомикоз	Итраконазол	Ирунин	Табл. 0,1	1 табл.	3 месяца	
Название заболевания: системный кандидоз (на Д-учете 50 больных)						
Системный кандидоз	Итраконазол	Ирунин	Табл. 0,1	1 табл.	3 месяца	
	Флюконазол	Форкан	Капс. 150 мг	1 капс./неделю	6 месяцев	
Название заболевания: саркома Капоши (на Д-учете 10 больных)						
Все клинические варианты	Преднизолон	Преднизолон	Табл. 0,005	5 табл.	30 дней 1-2 курса в год	
Название заболевания: лимфома (на Д-учете 50 больных)						
Все клинические варианты	Проспидина хлорид	Проспидин	Амп.	10-20 мг/неделю	1,5 месяца 1-2 курса в год	
Название заболевания: склеродермия (на Д-учете 100 больных)						
Линейная	Лидаза	Лидаза	Фл. 64 ед.	1 фл.	14 дней-2 курса/год	
С атрофией лица	Бензатин бензилпенициллин	Экстенциллин	Фл. 2,4 МЕ	1 фл./неделю	30 дней	

Диссеминированная	Бетаметазон	Дипроспан	Амп. 1,0	1 амп./неделю	1,5 месяца	
Лечение всех клинических вариантов идентичное.						
Название заболевания: хроническая пиодермия (на Д-учете 30 больных)						
язвенная, вегетирующая, непрерывно рецидивирующая формы	Аскорбиновая кислота	Аскорбиновая кислота	Табл. 0,1	4 табл.	10 дн.- 2 курса/год	
	Амоксициллин	Амоксициллин	Табл. 0,5	2 табл.	7-10 дн.- 2 курса/год	
Лечение всех клинических вариантов идентичное.						
Название заболевания: красная волчанка (на Д-учете 100 больных)						
диссеминированная форма	Хлоквин фосфат	Делагил	Табл. 0,25	4 табл.	3 мес. - 2 курса/год	
	Пентоксифиллин	Трентал	Драже 400 мг	6 драже	30 дн. - 2 курса/год	
	Преднизолон	Преднизолон	Табл. 0,005	20 табл.	30 дней пожизненно	
	Мометазон	Элоком	Крем - тюб. 0,1%-15,0	1-2 табл.	30 дн. (2 тюб.) - 2 курса/год	
Лечение всех клинических вариантов идентичное.						
Название заболевания: красный волосяной лишай Девержи (на Д-учете 20 больных)						
Субэритродермическая и эритродермическая формы	Ацитретин	Небтигазон	Табл. 25 мг	4 табл.	30 дней	
Лечение указанных клинических вариантов идентичное						
Название заболевания: псориаз (на Д-учете 400 больных)						
Эритродермическая форма; артропатическая форма	Гемодез	Гемодез	Фл. 400,0	1 фл.	4 дня - 2 курса/год	
	Бетаметазон	Дипроспан	Амп. 1,0	1 амп./неделю	2,5 мес.- 2 курса/год	
	Преднизолон	Преднизолон	Амп. 30 мг	3 амп.	30 дн. - 2 курса/год	
	Тиамин хлорид	Витамин В1	Амп. 5% -1,0	1 амп.	10 дн. - 2 курса/год	

	Пиридоксина гидрохлорид	Витамин В6	Амп. 5%-1,0	1 амп.	10 дн. - 2 курса/год	
	Цианокобаламин	Витамин В12	Амп. 500	1 амп.		
	Нимесулид	Нимулид	Табл. 0,1 мг	3 табл.	30 дн.- 2 курса/год	только для артропатической формы
Лечение всех клинических вариантов идентичное.						
Название заболевания: атопический дерматит (на Д-учете 500 больных)						
диффузный непрерывно рецидивирующий	Цетиризин	Зиртек	Табл. 0,01	1 табл.	7 дней - 2 курса/год	
	Хлоропирамин	Супрастин	Амп. 2%-1,0			
генерализованный непрерывно рецидивирующий	Мометазон	Элоком	Крем туб. 0,1%-15,0	1 амп.	30 дней (4 туба) - 2 курса/год	
Лечение указанных клинических вариантов идентичное						
Название заболевания: Герпетиформный дерматит Дюринга (на Д-учете 20 больных)						
Герпетиформный дерматит Дюринга	Диуцифон	Диуцифон	Капс. 0,1	3 Капс.	3 месяца	Препарат требует централизованной закупки в лепрозории г. Загорска
				1 Капс	пожизненно	
	Преднизолон	Преднизолон	Табл. 0,005	20 табл.	30 дней	
				2 табл.	пожизненно	
Калия и магния аспарагинат	Панангин	Табл.	6 табл.			
Название заболевания: буллезный пемфигоид (на Д-учете 25 больных)						
Распространенная непрерывно рецидивирующая	Преднизолон	Преднизолон	Табл. 0,005	12 табл.	1,5 месяца	
				2 табл.	пожизненно	
Лечение всех клинических вариантов идентичное.						
Название заболевания: пузырьчатка (на Д-учете 100 больных)						
Пузырьчатка вульгарная, вегетирующая,	Преднизолон	Преднизолон	Табл. 0,005	24 табл. 3 табл.	30 дней пожизненно	

	Бетаметазон	Дипроспан	Амп. 1,0	1 амп./неделю	3 месяца	
	Калия и магния аспарагинат	Панангин	Табл.	6 табл.	Пожизненно	
	Ретаболил	Ретаболил	Амп. 50 мг	1 амп./месяц		
	Метотрексат	Метотрексат	Амп. 50,0	1 амп./неделю	1,5 месяца	

Лечение всех клинических вариантов идентичное.

Название заболевания: сифилис (ежегодно регистрируется 5550 больных)

Сифилис вторичный и ранний скрытый (3000 больных)	Бензатин бензилпеницилин	Экстенциллин	Фл. 2,4 МЕ	1 фл./неделю	4 недели	64-66% больных	
	Бициллин-III	Бициллин-III	Фл. 600 тыс. ЕД	1,8 млн ЕД-2 раза/неделю	5 недель	30% больных	
	Прокаин бензилпенициллин	Прокаин бензилпенициллин G	Фл. 3 млн. ЕД	1,2 млнЕД	20 дней	2-3% больных	
	Цефтриаксон	Цефтриаксон натрия	Фл. 1.0	1	10 дней		
	*галавит	*галавит	Амп. 100 мг	50 мг	10 дней		
	Тиамин хлорид	Витамин В1	Амп. 5%-1,0	1 амп.	10 дней - 2 курса/год		
	Пиридоксина гидрохлорид	Витамин В6	Амп. 5%-1,0				
	Цианокобаламин	Витамин В12	Амп. 500				
	*Нимесулид	Нимулид	Табл. 0,1 мг	0,1 мг	10 дней		
	* Интерферон альфа - 2 -b	Виферон	свечи	1 свеча	10 дней		
Сифилис первичный (1000 больных)	Бензатин бензилпеницилин	Экстенциллин	Фл. 2,4 МЕ	1 фл. /неделю	3 недели		88-93% больных
	Бициллин - III	Бициллин- III	Фл. 600 тыс. ЕД	3фл.(1,8млн ЕД) - 2 раза/неделю	2,5 недели		3-5% больных

	Прокаин бензилпенициллин	Прокаин бензилпенициллин G	Фл. 3 млн. ЕД	1,2 млн. ЕД	10 дней	2-3% больных
	Ампициллин	Ампициллин	Фл. 500 тыс. ЕД	4 млн. ЕД	14 дней	1-2% больных
	Доксициклин	Доксициклин	Капс. 0,1	2 Капс.	15 дней	1-2% больных
Превентивное лечение сифилиса (1500 больных)	Бензатин бензилпенициллин	Экстенциллин	Фл. 2,4 МЕ	1 фл.	однократно	
	Бициллин-Ш	Бициллин-Ш	Фл. 600 тыс. ЕД	1,8 млн ЕД-2 раза/неделю	1 неделя	
Профлечение по сифилису (50 больных)	Прокаин бензилпенициллин	Прокаин бензилпенициллин G	Фл. 3 млн. ЕД	1,2 млнЕД	20 дней	
*Для лечения серорезистентных форм						

ЛЕЧЕНИЕ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Клинический вариант	Наименования препаратов		Форма выпуска дозировка	Средняя суточная доза	Длительность курса лечения	Примечание
	Международное	Торговое				
Название заболевания: закрытоугольная глаукома						
Закрытоугольная глаукома	Пилокарпин	Офтан Пилокарпин Пилокарпина гидрохлорид	Глазные капли 1% - 10 мл фл.	1 капля 1-6 раза в день	постоянно	
	Тимолола малеат	Арутимол Окумед	Глазные капли 0,25% и 0,5% - 5 мл фл.	1 капля 1-2 раза в день		
	Бетаксалол	Бетоптик	Глазные капли 0,5% -5 мл фл.	1 капля 2 раза в день		
	Проксодолол	Проксодолол	Глазные капли 1% - 1,5 мл тубик- Капельница	1 капля 2 раза в день		
	Тимолол, Пилокарпин	Фотил, Тимпило	Глазные капли тимолол 0,5%, пилокарпин 2% - 5 мл фл.	1 капля 2 раза в день		
	Дорзоламид	Трусопт	Глазные капли 2% - 5 мл фл.	1 капля 3 раза в день		
Название заболевания: открытоугольная глаукома						
Открытоугольная глаукома	Пилокарпин	Офтан Пилокарпин Пилокарпина гидрохлорид	Глазные капли 1% -10 мл фл.	1 капля 1-3 раза в день	Постоянно	
	Тимолола малеат	Арутимол Окумед	Глазные капли 0,25% и 0,5% - 5 мл фл.	1 капля 1-2 раза в день		
	Проксодолол	Проксодолол	Глазные капли 1% -1,5 мл тубик- Капельница	1 капля 2 раза в день		
	Тимолол	Фотил,	Глазные капли тимолол 0,5%,			
	Пилокарпин	Тимпило	пилокарпин 2% -5 мл фл.			
	Тимолол, Пилокарпин	Фотил-форте	Глазные капли тимолол 0,5%,пилокарпин 4% -5 мл фл.	1 капля 1 раз в день		

	Бетаксалол	Бетоптик	Глазные капли 0,5 % -5 мл фл.	1 капля 2 раза в день		
	Латанопрост	Ксалатан	Глазные капли 0,005 % -2,5 мл фл.	1 капля 1 раз в день		
	Дорзоламид	Трусопт	Глазные капли 2 % -5 мл фл.	1 капля 3 раза в день		
	Бринзоламид	Азопт	Глазные капли 1 % -5 мл фл.	1 капля 2 раза в день		
Название заболевания: глаукома, катаракта						
Открытоуголь- ная глаукома	Пилокарпин	Офтан Пилокарпин Пилокарпина гидрохлорид	Глазные капли 1% -10 мл фл.	1 капля 1-3 раза в день	Постоянно	
	Тимолола малеат	Арутимол Оку мед	Глазные капли 0,25% и 0,5% - 5 мл фл.	1 капля 1-2 раза в день		
	Проксодолол	Проксодолол	Глазные капли 1% -1,5 мл тюбик- Капельница	1 капля 2 раза в день		
	Тимолол, Пилокарпин	Фотил, Тимпило	Глазные капли тимолол 0,5 %, пилокарпин 2% -5 мл фл.	1 капля 2 раза в день		
	Тимолол, Пилокарпин	Фотил-форте	Глазные капли тимолол 0,5 %, пилокарпин 4% -5 мл фл.	1 капля 1 раз в день		
	Бетаксалол	Бетоптик	Глазные капли 0,5% -5 мл фл.	1 капля 2 раза в день		
	Латанопрост	Ксалатан	Глазные капли 0,005% -2,5 мл фл.	1 капля 1 раз в день		
	Травопрост	Траватан	Глазные капли 0,004%-25мл фл.	1 капля 1 раз в день		
	Дорзоламид	Трусопт	Глазные капли 2% -5 мл фл.	1 капля 3 раза в день		
	Бринзоламид	Азопт	Глазные капли 1% -5 мл фл.	1 капля 2 раза в день		
	Пилокарпин	Офтан, Пилокарпин, Пилокарпина гидрохлорид	Глазные капли 1% -10 мл фл.	1 капля 1-6 раза в день	Постоянно	

Закрытоугольная глаукома	Тимолола малеат	Арутимол Оку мед	Глазные капли 0,25% и 0,5% - 5 мл фл.	1 капля 1-2 раза в день	Постоянно
	Бетаксалол	Бетоптик	Глазные капли 0,5% -5 мл фл.	1 капля 2 раза в день	Постоянно
	Проксодолол	Проксодолол	Глазные капли 1% -1,5 мл тубик-Капельница	1 капля 2 раза в день	Постоянно
	Тимолол , Пилокарпин	Фотил, Тимпило	Глазные капли тимолол 0,5%, пилокарпин 2% -5 мл фл.	1 капля 2 раза в день	Постоянно
	Дорзоламид	Трусопт	Глазные капли 2% -5 мл фл.	1 капля 3 раза в день	Постоянно
Для послеоперационных больных	Дексаметазон	Дексаметазон POS, Дексаметазон	Глазные капли 0,1% -5 мл фл.	1 капля 1-6 раз в день	В послеоперационном периоде
Для больных связанных с экстракцией катаракты	Хлорамфеникол	Левомецетин	Глазные капли 0,25 % —5 мл фл.		
	Ципрофлоксацин	Ципромед	Глазные капли 5 мл фл.	1 капля 3-6 раз в день	

ЛЕЧЕНИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ВЗРОСЛЫХ

Клинический вариант	Наименование препаратов		Форма выпуска, дозировка	Средняя суточная доза	Длительность курса лечения	Примечание
	Международное	Торговое				
Наименование заболевания: органическое поражение головного мозга						
Нарушения когнитивных функций у детей	Пирацетам	Пирацетам, луцетам	Капс. 0.4 №60	1.0	1-1,5 лет	
	Пикамилон	Пикамилон		0.05		
	Перициазин	Неулептил	Кап. 0.01 №50	0.02		
	Тиоридозин	Сонапакс	Табл. 0.025 №60	0.075		
	Холин альфосцерат	Глиатилин	Кап. 0.4 №14	0.8		
Органические непсихотические расстройства. Органическая деменция	Пантогам	Пантогам	0,25 №50	1.5		
	Фенибут	Фенибут	0,25 №50	0.5		
Умственная отсталость	Пантогам	Пантогам	0,25 №50	1.5		
	Фенибут	Фенибут	0,25 №50	0.5		
	Пирацетам	Пирацетам, луцетам	Капс. 0.4 №60	1.0		
	Перициазин	Неулептил	Кап. 0,01 №50	0.02		
	Тиоридазин	Сонапакс	Табл. 0.025 №60	0.075		
Органические психозы	Зуклопентиксол	Клопиксол-депо	Амп. 200 мг 1 мл №10	2.0/2недели	Принимать до наступления устойчивой полной ремиссии	
	Рisperидон	Риполент	Табл. 0.002 №20	0.004		
	Флюпентиксол	Флуанксол	Табл. 0.0005, 0.001 №50	0.04		
	Клозапин	Азалептин	Табл. 0.025 №10	0.10		
	Сульпирид	Эголонил	Табл. 0.2 №12	0.4		
	Кветиапин	Сероквель	Табл. 0.025 , 0,1, 0,2	0.4		
	Оланзапин	Зипрекса	Табл. 0.005 №28	0.01		

Наименование заболевания: аффективный психоз					
Эффективные психозы 30.0-30.2 (маниакальный эпизод)	Карбамазепин	Финлепсин	Табл. 0.2 №50	0.04	Принимать до наступления устойчивой полной ремиссии
	Нитразепам	Радедорм	Табл. 0.005 №20	0.005	
Аффективные психозы F 31.3-31.5 (биполярное расстройство с депрессивным эпизодом)	Амитриптилин	Амитриптилин	Табл 0,025; 0,05 №50	0.15	
	Нитразепам	Нитразепам		0.005	
	Карбамазепин	Финлепсин		0.4	
Аффективные психозы F 31.0-31.2 (биполярное расстройство с маниакальным эпизодом)	Кармазепин	Финлепсин	Табл. 0.2 №50	0.4	
	Литий	Седолит		0.9	
	Феназепам	Феназепам	Табл. 0.0005, 0.001 №50	0.002	
Аффективные психозы F 32.0 (легкой степени)	Фенибут	Фенибут	Табл. 0.02 №28	75	
	Циталопрам	Ципрамил		0.04	
	Тианептин	Коаксил	Табл. 0.00125 №30		
	Нитразепам	Нитразепам	Табл. 0.005 №20		
Аффективные психозы F 32.1 (средней тяжести)	Миртазапин	Ремерон	т. 0.3 №30	0.06	
	Феназепам	Феназепам	Табл. 0.0005; 0.001 №50	0.002	
Аффективные психозы F 32.2 - 32.3 (тяжелой степени без психотической и с психотической с-кой)	Амитриптилин	Амитриптилин	Табл. 0.025; 0.05 №50	0.10	
	Флуоксетин	Флуоксетин		0.02	
	Флюпентиксол	Флюанксол	Табл. 0.0005, 0.001 №50	0.02	
Наименование заболевания: эпилепсия					
Тонико-клонические приступы	Вальпроевая к-та	Депакин-хроно	Табл. 0.3 №100	1.5	Принимать до наступления устойчивой полной ремиссии
	Карбамазелин	Финлепсин	Табл. 0.2 №50	0.6	
	Ламотриджин	Ламиктал		0.4	
	Топирамат	Топамакс	Табл. 0.1 №28	0.4	
	Вальпроевая к-та	Клоназепам	Табл. 0.0002 №30	0.004	
	Фенабарбитал	Фенабарбитал	Табл.0.1 №6	0.2	

Абсансы	Этасуксимд	Суксилеп	Кап. 0.25 №120	1.0		
	Вальпроевая к-та	Депакин-хроно	Табл. 0.3 №100	1.5		
	Фенабарбитал	Ламиктал		0.4		
Парциальные	Карбамазепин	Финлепсин	Табл. *0.2 №50	0.6		
	Ламотриджин	Ламиктал	Т. 0.025	0.4		
	Антелепсин	Клоназепам	Табл. 0.0002 №30	0.004		
Наименование заболевания: шизофрения						
Шизофрения 20.0 (Параноидная шизофрения)	Зуклопентиксол	Клопиксол-депо	Амп. 200 мг 1 мл №10	2.0/2недели	Принимать до наступления устойчивой полной ремиссии	
Шизофрения 20.1 (Гебефреническая шизофрения)	Рisperидон	Рисполепт	Табл. 0.002 №20	0.004		
	Кветиапин	Сероквель	Табл. 0.025 , 0,1, 0,2	0.4		
	Флупентиксол	Флюанксол	Табл. 0.0005, 0.001 №50	0.04		
Шизофрения 20.2 . (Кататоническая шизофрения)	Рisperидон	Рисполепт	Табл. 0.002 №20	0.006		
	Кветиапин	Сероквель	Табл. 0.025 , 0,1, 0,2	0.4		
	Клозапин	Азалептин	Табл. 0.025 №50	0.10		
	Тиопроперазин	Мажептил	Табл. 0.01 №20	0.04		
Шизофрения 20.4 (Постшизофреническая депрессия)		Основной препарат (рисполепт или флюанксол)		Для рисполепта: 0.004; для флюанксола 0.03		
	Миргазапин	Ремерон	Т. 0.3 №30	0.03		
Шизофрения 20.6 (простой тип)	Сульпирид	Эглонил	Т. 0.2 №12	0.4	Принимать до наступления устойчивой полной ремиссии	
	Кветиапин	Сероквель	Табл. 0.025 , 0,1, 0,2	0.4		
	Рisperидон	Рисполепт	Табл. 0.002 №20	0.004		
	Амисульприд	Солиан	Табл. 0,02 №30			

	Флупентиксол	флюанксол	Табл. 0.001 №50	0.025	
Шизоаффективные психозы F25.0 (маникальный тип)	Клозапин	Азалептин	Табл. 0.025 №50	0.1	
	Карбамазепин	финлепсин	Табл. 0.2 №50	0.6	
	Труксал	Труксал	Табл. 0.05 №50	0.05	
Шизоаффективные психозы F25.1 (депрессивный тип)	Феназепам	Феназепам	Табл. 0.0005; 0.001 №50	0.003	
	Клозапин	Азалептин	Табл. 0.025 №50	0.075	
	Тианептин	Коаксил	Табл. 0.00125 №30	0.0125	
	Сульпирид	Эглонил	Табл. 0.2 №12	0.2	
Шизоаффективные психозы F25.2 (смешанный тип)	Клозапин	Азалептин	Табл. 0.025 №50	0.1	
	Сертралин	Стимулатон	Табл. 0.05 №14	0.05	
	Феназепам	Феназепам	Табл. 0.001 №50	0.001	

ЛЕЧЕНИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ

Клинические варианты	Наименование препарата		Форма выпуска, дозировка	Среднесуточная доза	Длительность курса лечения	Примечание
	МНН	Торговое				
Название заболевания: Эпилепсия						
локально обусловленная тип припадка простые, сложные вторично-генерализованные	Противосудорожная терапия					
	карбамазепин	финлепсин	табл. 200 мг.	20-30 мг/кг/сут	постоянно	5 лет отсутствия приступов
		финлепсин ретард	табл. 200 мг, 400 мг.	20-30 мг/кг/сут	постоянно	5 лет отсутствия приступов
		тегретол ЦР	табл. 200 мг, 400 мг.	20-30 мг/кг/сут	постоянно	5 лет отсутствия приступов
	топирамат	топамакс	табл. 25 мг., 100 мг.	3-8 мг/кг/сут	постоянно	5 лет отсутствия приступов
	ламотриджин	ламиктал	табл. 25 мг., 50 мг, 100 мг.	1-5 мг/кг/сут	постоянно	5 лет отсутствия приступов
	вальпроевая кислота	депакин энтерик	табл. 300 мг.	30-60 мг/кг/сут	постоянно	5 лет отсутствия приступов
		депакин хроно	табл. 300 мг., 500 мг.	30-60 мг/кг/сут	постоянно	5 лет отсутствия приступов
		конвулекс	табл. 300 мг.	30-50 мг/кг/сут	постоянно	5 лет отсутствия приступов
		конвулекс ретард	табл. 500 мг.	30-60 мг/кг/сут	постоянно	5 лет отсутствия приступов
	бензобарбитал	бензонал	табл. 100 мг.	1-5 мг/кг/сут	постоянно	5 лет отсутствия приступов
	фенобарбитал	фенобарбитал	табл. 5 мг., 50 мг., 100 мг.	1-5 мг/кг/сут	постоянно	5 лет отсутствия приступов
	фенитоин	дифенин	табл. 117 мг.	5-8 мг/кг/сут	постоянно	5 лет отсутствия приступов

	диазепам	сибазон р-р в/в и в/м	5 мг/мл x 2 мл	0,2-1 мг/кг/сут	постоянно	5 лет отсутствия приступов
		сибазон	табл. 5 мг	0,2-0,5 мг/кг/сут	постоянно	5 лет отсутствия приступов
		реланиум	табл. 5 мг	0,2-0,5 мг/кг/сут	постоянно	5 лет отсутствия приступов
первично генерализованная тип припадка тонико-клонические типичные абсансы атипичные абсансы: атонические, тонические, миоклонические миоклонические приступы	вальпроевая кислота	депакин	табл. 300 мг.	30-50 мг/кг/сут	постоянно	5 лет отсутствия приступов
		депакин энтерик	табл. 300 мг.	30-50 мг/кг/сут	постоянно	5 лет отсутствия приступов
		депакин хроно	табл. 300 мг, 500 мг.	30-50 мг/кг/сут	постоянно	5 лет отсутствия приступов
		конвулекс	табл. 300 мг.	30-50 мг/кг/сут	постоянно	5 лет отсутствия приступов
		конвулекс ретард	табл. 500 мг.	30-50 мг/кг/сут	постоянно	5 лет отсутствия приступов
	этосуксимид	суксилеп	капс. 250 мг	15 мг/кг/сут	постоянно	5 лет отсутствия приступов
	топирамат	топамакс	табл. 25 мг, 100 мг	5 мг/кг/сут	постоянно	5 лет отсутствия приступов
	ламотриджин	ламиктал	табл. 25 мг, 50 мг, 100 мг	5 мг/кг/сут	постоянно	5 лет отсутствия приступов
	клоназепам	клоназепам	табл. 0,5 мг, 2 мг	0,1-0,2 мг/кг/сут	постоянно	5 лет отсутствия приступов
	бензобарбитал	бензонал	табл. 100 мг	1-5 мг/кг/сут	постоянно	5 лет отсутствия приступов
фенитоин	дифенин	табл. 117 мг.	4-6 мг/кг/сут	постоянно	5 лет отсутствия приступов	

Сопутствующая патогенетическая						
	фенибут	фенибут	табл.250 мг	Детям до 8 лет по 0,05 - 0,1 г 3 раза в день. Детям от 8 - 14 лет по 0,25 г 3 раза в день. Старше 14 лет по 0,25 -0,5г 3 раза в день.	1 мес.	2 курса в год
Психические нарушения						
легкие когнитивные нарушения	холина альфосцерат	глиатилин	Капс. 400 мг	до 6 лет по 1 капс.два раза в сутки; старше 6 лет по 1 Капс, три раза в сутки	3 мес.	два курса в год
	пирацетам	пирацетам	табл. 200 мг, 400 мг	До 5 лет 600 мг/сут в три приема, максимальная 800 мг/сут. От 5 - до 16 -1200 мг/сут в три приема, максимальная 1800.	3 мес	два курса в год
	гопантеновая кислота	пантогам	табл.250 мг	2,5 - 3 мг/кг/сутки	3мес	два курса в год
		пантокальцин	табл.250 мг	2,5 - 3 мг/кг/сутки	3 мес	два курса в год
дисфорические реакции	рисперидон	рисполепт	табл.2 мг	1-2 мг. в сутки	2 - 4 нед	детям до 16 лет информированное согласие родителей, в дальнейшем переход на ноотропные препараты с седативным эффектом.
	тиоридазин	меллирил	драж. 10 мг, 25 мг	Средняя суточная доза для детей 30 мг/сут, 75 мг/сут у подростков	1-2 мес.	в дальнейшем переход на ноотропные препараты с седативным эффектом.
		сонапакс	драж. 10 мг, 25 мг	тоже	1-2 мес.	в дальнейшем переход на ноотропные препараты с седативным эффектом.

	перициазин	неулептил	Капс. 10 мг; р-р-кап. перор 40мг/мл 125 мл	Средняя суточная доза для детей 3 мг/сут, 30 мг/сут у подростков	1-2 мес.	в дальнейшем переход на ноотропные препараты с седативным эффектом.
	фенибут	фенибут	табл.250 мг	Детям до 8 лет по 0,05 - 0,1 г 3 раза в день. Детям от 8 - 14 лет по 0,25 г 3 раза в день. Старше 14 лет по 0,25 -0,5г 3 раза в день.	1 мес.	2 курса в год
	гопантенная кислота	пантогам	табл.250 мг	2,5 - 3 мг/кг/сутки	3 мес	два курса в год
дистимии	сульпирид	эглонил	табл.200 мг	Средняя суточная доза для детей 100 мг/сут, 600 мг/сут у подростков	1-2 мес.	в дальнейшем переход на ноотропные препараты с седативным эффектом.
	фенибут	фенибут	табл. 250 мг	Детям до 8 лет по 0,05 - 0,1 г 3 раза в день. Детям от 8 - 14 лет по 0,25 г 3 раза в день. Старше 14 лет по 0,25 0,5г 3 раза в день.	1 мес.	2 курса в год
	гопантенная кислота	пантогам	табл. 250 мг	2,5 - 3 мг/кг/сутки	3 мес	два курса в год
Название заболевания: Шизофрения						
детский тип	галоперидол	галоперидол	табл. 1мг, 1,5 мг, 5 мг, 10 мг	Средняя суточная доза для детей 0,1-0,3 мг/сут, от 7-14 лет 0,75-4,5 мг/сут; от 15-18 лет от 1,5-9 мг/сут	Применять не менее 6 мес.после наступления устойчивой ремиссии	при явлениях нейролепсии назначение противопаркинсон. препаратов
	рисперидон	рисполепт	табл. 2 мг	от 2-4 мг, макс. 6 мг		детям до 12 лет информированное согласие родителей

	клозапин	азалептин	табл. 25 мг, 100 мг	от 6-8 лет разова доза 5-10 мг; суточная 15-30 мг; от 8-15 лет разовая 10-20 мг, суточная 30-60 мг	
	перициазин	неулептил	Капс. 10 мг, фл. 40 мг/100 мл	от 3-6 лет 1-3 мг/сут; от 7-14 лет 2-20 мг/сут; от 15-18 лет 5-40 мг/сут	
простая форма	левомепромазин	левомепромазин	табл. 25 мг, 50 мг, амп.	от 3-6 лет 6-25 мг/сут; от 7-14 лет 12,5-75 мг/сут; от 15-18 лет 12,5-100 мг/сут	при явлениях нейролепсии назначение противопаркинсон. препаратов
		тизерцин	табл. 25 мг, 50 мг, амп.	от 3-6 лет 6-25 мг/сут; от 7-14 лет 12,5-75 мг/сут; от 15-18 лет 12,5-100 мг/сут	
	перициазин	перициазин	Капс. 10 мг, фл. 40 мг/100 мл	от 3-6 лет 1-3 мг/сут; от 7-14 лет 2-20 мг/сут; от 15-18 лет 5-40 мг/сут	
		неулептил	Капс. 10 мг, фл. 40 мг/100 мл	от 3-6 лет 1-3 мг/сут; от 7-14 лет 2-20 мг/сут; от 15-18 лет 5-40 мг/сут	
	зуклопентиксол	зуклопентиксол	табл. 2 мг, 10 мг.	старше 12 лет 7,5-45 мг/сут в 2 приема	Применять не менее 3 -6 мес.после наступления устойчивой ремиссии
		клопиксол	табл. 2 мг, 10 мг.	старше 12 лет 7,5-45 мг/сут в 2 приема	
	тиоридазин	меллирил	драж. 10 мг, 25 мг	Средняя суточная доза для детей 30 мг/сут, 75 мг/сут у подростков	Применять не менее-6 мес.после наступления устойчивой ремиссии.
		сонапакс	драж. 10 мг, 25 мг	тоже	

параноидная форма	Флупентиксол	Флюанксол	табл. 1 мг, 5 мг	с 12 лет 0,5-5 мг/сут в 2 приема	Применять не менее 3 -6 мес.после наступления устойчивой ремиссии.		
	клозапин	азалептин	табл. 25 мг, 100 мг	от 6-8 лет разова доза 5-10 мг; суточная 15-30 мг; от 8-15 лет разовая 10-20 мг, суточная 30-60 мг			
	левомепромазин	левомепромазин	табл. 25 мг, 50 мг, амп.	от 3-6 лет 6-25 мг/сут; от 7-14 лет 12,5-75 мг/сут; от 15-18 лет 12,5-100 мг/сут			Применять не менее 3 -6 мес.после наступления устойчивой ремиссии
		тизерцин	табл. 25 мг, 50 мг, амп.	от 3-6 лет 6-25 мг/сут; от 7-14 лет 12,5-75 мг/сут; от 15-18 лет 12,5-100 мг/сут			
	зуклопентиксол	зуклопентиксол	табл. 2 мг, 10 мг.	старше 12 лет 7,5-45 мг/сут в 2 приема			Применять не менее 3 -6 мес.после наступления устойчивой ремиссии
		клопиксол	табл. 2 мг, 10 мг.	старше 12 лет 7,5-45 мг/сут в 2 приема			
другие формы	рисперидон	рисполепт	табл.2 мг	от 2-4 мг, макс. 6 мг	Применять не менее 3 -6 мес.после наступления устойчивой ремиссии	детям до 12 лет информированное согласие родителей при явлениях нейролепсии назначение противопаркинсон препаратов	
	клозапин	азалептин	табл. 25 мг, 100 мг	от 6-8 лет разова доза 5-10 мг; суточная 15-30 мг; от 8-15 лет разовая 10-20 мг,			
	перипциазин	неулептил	капс. 10 мг, фл. 40 мг/100 мл	от 3-6 лет 1-3 мг/сут; от 7-14 лет 2-20 мг/сут; от 15-18 лет 5-40 мг/сут			
	левомепромазин	левомепромазин	табл. 25 мг, 50 мг, амп.	от 3-6 лет 6-25 мг/сут; от 7-14 лет 12,5-75 мг/сут; от 15-18 лет 12,5-100 мг/сут			
		тизерцин	табл. 25 мг, 50 мг, амп.	от 3-6 лет 6-25 мг/сут; от 7-14 лет 12,5-75 мг/сут; от 15-18 лет 12,5-100 мг/сут			

	зуклопентиксол	зуклопентиксол	табл. 2 мг, 10 мг.	старше 12 лет 7,5-45 мг/сут в 2 приема	Применять не менее 6 мес. после наступления устойчивой ремиссии	
		клопиксол	табл. 2 мг, 10 мг.	старше 12 лет 7,5-45 мг/сут в 2 приема		
	тиоридазин	меллирил	драж. 10 мг, 25 мг	Средняя суточная доза для детей 30 мг/сут, 75 мг/сут у подростков		
		сонапакс	драж. 10 мг, 25 мг	То же		
	Флупентиксол	Флюанксол	табл. 1 мг, 5 мг	с 12 лет 0,5-5 мг/сут в 2 приема		
Имипрамин	Мелипрамин	драж. 25 мг	7-14 лет 12,5-50 мг/сут; 15-18 лет 25-125 мг/сут в 2-3 приема			
средства для лечения паркинсонизма						
	тригексифенидил	Циклодол	табл. 2 мг	5-20 мг/сут		для профилактики и компенсации явлений нейролепсии
Дети до 3-х лет и дети до 6 лет из многодетных семей						
<u>Название заболевания: смешанное специфическое расстройство психологического развития</u>						
	холина альфосцерат	глиатилин	капс. 400 мг	до 6 лет по 1 капс два раза в сутки; старше 6 лет по 1 капс, три раза в сутки	3 мес.	
	пирацетам	пирацетам	табл. 200 мг, 400 мг	До 5 лет 600 мг/сут в три приема, максимальная 800 мг/сут. От 5 -до 16 -1200 мг/сут в три приема, максимальная 1800.	3 мес	
	гопантеновая кислота	пантогам	табл. 250 мг	2,5 - 3 мг/кг/сутки	3 мес	

Название заболевания: умственная отсталость						
	холина альфосцерат	глиатилин	Капс. 400 мг	до 6 лет по 1 Капс два раза в сутки; старше 6 лет по 1 Капс, три раза в сутки	3 мес	
	пирацетам	пирацетам	табл. 200 мг, 400 мг	До 5 лет 600 мг/сут в три приема, максимальная 800 мг/сут. От 5 - до 16 -1200 мг/сут в три приема,	3 мес	
	гопантенная кислота	пантогам	табл.250 мг	2,5 - 3 мг/кг/сутки	3 мес	
Название заболевания: другие психические непсихотические расстройства (неврозоподобные)						
	феназепам	феназепам	табл. 0,5 мг, 1 мг	до 6 лет макс.доза 0,25 мг.; 7-14 лет 0,25-1 мг; старше 15 лет 1-3 мг	2-3 недели	в дальнейшем переход на ноотропные препараты с седативным эффектом.
	фенибут	фенибут	табл. 250 мг	Детям до 8 лет по 0,05 - 0,1 г 3 раза в день. Детям от 8 - 14 лет по 0,25 г 3 раза в день. Старше 14 лет по 0,25 -0,5г 3 раза в день.	1 мес.	2 курса в год
	гопантенная кислота	пантогам	табл.250 мг	2,5 - 3 мг/кг/сутки	3 мес	

Примечание: при лечении больных эпилепсией, находящихся под наблюдением психиатра, необходимо учитывать, что данная группа больных была резистентной к ранее проводимой монотерапии. В связи с этим данная категория больных получает комбинированную противосудорожную терапию. При назначении оптимальных комбинаций противосудорожных препаратов необходимо сочетать антиконвульсанты с разным механизмом действия.

Препараты выбора и их комбинации в зависимости от типа припадков

Тип припадка	Препарат выбора	Оптимальная комбинация	примечания
Парциальные (локально-обусловленные): Простые	Карбамазепин	Топирамат Ламотриджин Вальпроевая кислота	Дозы не превышают средне терапевтические
Парциальные (локально-обусловленные): Сложные	Вальпроевая кислота	Топирамат Ламотриджин	
Парциальные	Карбамазепин	Топирамат Ламотриджин вальпроевая кислота Гедантоин (дифенин) Фенобарбитал, Бензонал	Дозы не превышают средне терапевтические
Вторично - генерализованные	Гедантоин (дифенин) Фенобарбитал, бензонал	Топирамат Ламотриджин	
Генерализованные: Тонико – клонические	Вальпроевая кислота	Топирамат Ламотриджин вальпроевая кислота Гедантоин (дифенин) Фенобарбитал, бензонал	Дозы не превышают средне терапевтические
Типичные абсансы	Вальпроевая кислота Этосуксимид	Этосуксимид Топирамат, Ламотриджин	
Атипичные абсансы	Вальпроевая кислота	Топирамат, Ламотриджин Клоназепам	

При лечении шизофрении больных, не подлежащих неотложной госпитализации и находящихся в стадии обострения, применяются сочетания препаратов с преимущественным антипсихотическим действием (клозапин, рисполепт, флюанксол, галоперидол) и с преимущественным седативным действием (хлорпромазин, тизерцин, клопиксол, тиоридозин, неолептил). Лечение обострений до 3-х месяцев. Сроки поддерживающей терапии от 3-х месяцев до постоянного употребления. Количество назначаемых препаратов варьируется от 1/3 доз лечения острых состояний до применения одного из препаратов в минимальных дозах.

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ

Клинический вариант	Наименование препаратов		Форма выпуска, дозировка	Средняя суточная доза	Длительность курса лечения	Примечание
	Международные	Торговые				
Лекарственно-чувствительный туберкулез	Изониазид	Изониазид	10% 5 мг № 10 (амп.)	10 мг/кг (0,6-0,9)	3-6 мес.	С учетом профилактического лечения
	Изониазид	Изониазид	Табл.0,3 № 10	10 мг/кг (0,3-0,9)	3-9 мес.	
	Метазид	Метазид	Табл.0,5 № 10	10 мг/кг (0,5-1,0)	3-6 мес.	С учетом химиопрофилактики
	Фтивазид	Фтивазид	Табл.0,5 № 10	20 мг/кг (0,5-1,5)	3-6 мес.	
	Феназид	Феназид	Табл.0,25 № 50	0,5	3-9 мес.	
	Стрептомицин	Стрептомицин	Флак. 1,0	16 мг/кг (1,0)	3 мес.	
	Рифампицин	Рифампицин	Капс. 0,15 № 20	10 мг/кг (0,45-0,6)	6-9 мес.	
	Рифампицин	Рифампицин	Амп. 0,15 № 10	10 мг/кг (0,45-0,6)	3-4 мес.	
	Пиразинамид	Пиразинамид	Таб. 0,5 № 100	25 мг/кг (1,5)	6 мес.	
	Этамбутол	Этамбутол	Табл.0,4 № 100	20 мг/кг (1,2)	6-9 мес.	
	Фтизопирам	Фтизопирам	Табл. № 100	10 мг/кг	2-3 мес.	
	Фтизоэтам	Фтизоэтам	Табл. № 100	10 мг/кг	2-3 мес.	
Лекарственно устойчивый туберкулез	Канамицин	Канамицин	Флак. (1,0)	16 мг/кг (1,0)	2-3 мес.	
	Амикацин	Амикацин	Флак. (0,5)	16 мг/кг (1,0)	2-3 мес.	
	Циклосерин	Циклосерин	Капс. 0,25 № 100	12,5 мг/кг (0,75)	2-3 мес.	
	Рифабутин	Микобутин (рифабутин)	Капс.0,15 № 30	5 мг/кг (0,3)	6-9 мес.	
	Ломефлоксацин	Максаквин	Табл. 0,4 № 5	13,3 мг/кг (0,8)	3 мес.	
	Левифлоксацин	Таваник	Табл.500 мг № 5	500 мг	3 мес.	

	Протионамид	Протионамид	Табл.0,25 мг № 50	12,5 мг/кг (0,75)	6 мес.	
	Аминосалициловая кислота	ПАСК-акри	Табл.1000 мг № 500	200 мг/кг (12,0-16,0)	6-9 мес.	
Все формы туберкулеза	Гепатопротективные препараты					
	Эссенциальные фосфолипиды	Эссенциале форте-Н	Капс. 0,3 № 30	0,9-1,8	2-3 мес.	
	Эссенциальные фосфолипиды	Эссенциале	Амп. 5,0 № 5	5,0	10 дней	

ЛЕЧЕНИЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА

Клинический вариант	Наименования препаратов		Форма выпуска, дозировка	Средняя доза на цикл	Длительность курса лечения	Примечание
	Международное	Торговые				
Название заболевания: сахарный диабет						
Сахарный диабет 1 типа; Сахарный диабет 2 типа, инсулинопотребный,	Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный)	Актрапид НМ	100 ЕД 10,0 мл фл.	50-60 ЕД	Пожизненно	При интенсифицированной инсулинотерапии вводится $\frac{1}{2}$ - $\frac{2}{3}$ от суточной дозы.
			100 ЕД/мл 3,0 №5 пенф.	50-60 ЕД	Пожизненно	
		Хумулин R	100 ЕД 10,0 мл фл.	50-60 ЕД	Пожизненно	
			100 ЕД/мл 3,0 №5 пенф.	50-60 ЕД	Пожизненно	
		Инсуман рапид	100 ЕД/мл 5 мл № 5 фл.	50-60 ЕД	Пожизненно	
			100 ЕД/мл 3мл №5 пенф.	50-60 ЕД	Пожизненно	
	Инсулин аспарт	Новорапид	100 ЕД/мл 3,0 мл №5 пенф.	50-60 ЕД	Пожизненно	
	Инсулин лиз про	Хумалог	100 ЕД/мл 3,0 мл №5 пенф.	50-60 ЕД	Пожизненно	
	Инсулин гларгин	Лантус	100 ЕД/мл 3,0 мл №5 пенф.	50-60 ЕД	Пожизненно	
Инсулин изофан (человеческий генно-инженерный)	Протафан НМ	100 ЕД 10,0 мл фл.	50-60 ЕД	Пожизненно		
		100 ЕД/мл 3,0 № 5 пенф.	50-60 ЕД	Пожизненно		

		Хумулин НПХ	100 ЕД 10,0 мл фл	50-60 ЕД	Пожизненно
			100 ЕД/мл 3,0 № 5 пенф.	50-60 ЕД	Пожизненно
		Инсуман базал	100 ЕД/мл 5 мл № 5 фл.	50-60 ЕД	Пожизненно
			100 ЕД/мл 3 мл №5 пенф.	50-60 ЕД	Пожизненно
	Инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный)	Микстард 30/70	100 ЕД 10,0 мл фл.	50-60 ЕД	Пожизненно
			100 ЕД/мл 3,0 мл №5 пенф.	50-60 ЕД	Пожизненно
		Инсуман комб 25/75	100 ЕД/мл 5мл № 5 фл.	50-60 ЕД	Пожизненно
		Хумулин МЗ	100 ЕД/мл 10,0 мл фл.	50-60 ЕД	Пожизненно
			100 ЕД/мл 3,0 мл №5 пенф.	50-60 ЕД	Пожизненно
	Инсулин аспарт двухфазный (человеческий генно-инженерный)	Новомикс 30 Пенфилл	100 ЕД/мл 3,0 мл №5 пенф.	50-60 ЕД	Пожизненно
Сахарный диабет 2 типа	Глибенкламид	Манинил 3,5	0,0035 № 120 тб.	Минимальная доза - 3,5 мг/сут, максимальная - 14 мг/сут.	Пожизненно
		Манинил 1,75	0,00175 № 120 тб.	Минимальная доза - 1,75 мг/сут, максимальная- 14 мг/сут.	Пожизненно
	Гликлазид	Диабетон МВ	0,03 № 60 тб.	Минимальная доза — 30 мг/сут, максимальная - 120 мг/сут.	Пожизненно

		Глидиаб МВ	0,03 № 60 тб.	Минимальная доза - 30 мг/сут, максимальная - 120 мг/сут.	Пожизненно
	Метформин	Сиофор 850	850 мг № 60 тб.	Минимальная доза - 850 мг/сут, максимальная - 3000 мг/сут.	Пожизненно
		Глюкофаж	850 мг № 60 тб. 1000 мг № 60 тб.	Минимальная доза - 1000 мг/сут, максимальная - 3000 мг/сут.	Пожизненно
		Метфогамма 850	850мг№120тб.	Минимальная доза - 850 мг/сут, максимальная - 3000 мг/сут.	Пожизненно
	Глибенкламид + метформин	ГлибOMET	№ 40 тб.	Минимальная доза - 1 таб/сут, максимальная - 5 таб/сут.	Пожизненно
	Гликвидон	Глюренорм	0,03 № 60 тб.	Минимальная доза - 30 мг/сут, максимальная — 120 мг/сут.	Пожизненно
	Репаглинид	Новонорм	0,5 мг № 30 тб. 1 мг № 30 тб. 2 мг № 30 тб.	Минимальная доза - 0,5 мг/сут, максимальная - 16 мг/сут.	Пожизненно

	Глимепирид	Амарил	1 мг № 30 тб. 2 мг № 30 тб. 3 мг № 30 тб. 4 мг № 30 тб.	Минимальная доза - 1 мг/сут, максимальная - 8 мг/сут.	Пожизненно	
Название заболевания: Тяжелые гипогликемические состояния						
Тяжелые гипогликемические состояния	Глюкагон	Глюкаген	1 мг № 1 фл.	1 мг	Для выведения из тяжелых гипогликемических состояний	Сухое вещество для п/к, в/м, в/в инъекций в комплекте с растворителем
		Глюкагон	1 мг № 1 фл.	1 мг	Для выведения из тяжелых гипогликемических состояний	Лиофилизированное сухое вещество для п/к, в/м, в/в инъекций во флаконе объемом 1 мл в комплекте с растворителем
Название заболевания: осложнения сахарного диабета						
Диабетическая полинейропатия	Тиоктовая (альфа-липоевая) кислота	Берлитион	300 мг № 30 тб.	Средняя суточная доза 300-600 мг	2 месяца	Обычно требуется не менее 2-х курсов лечения в год
		Эспа-липон	600мг№30тб.			
		Тиогама	600 мг № 30 тб. 600 мг № 60 тб.			
Диабетическая микроангиопатия (нефропатия, ретинопатия, нейропатия) и макроангиопатия	Сулодексид	Вессел Дуэ Ф	250 ед. Капс. № 50	Средняя суточная доза по 1 капс. 2 раза в день	1-1,5 месяца	Курс лечения следует повторять не менее 2 раз в год

СРЕДСТВА ВВЕДЕНИЯ ИНСУЛИНА И САМОКОНТРОЛЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА

Сахарный диабет 1 и 2 типа.	Шприцы инсулиновые	Шприцы инсулиновые с несъемной иглой 17-100 1,0 мл №100		1 упаковка/месяц		
		Шприцы инсулиновые с несъемной иглой ЦТ-100 0,5 мл №100		1 упаковка/месяц		
	Шприц-ручки для введения инсулина в картриджах	Шприц-ручка Хума Пен Эрго				Шприц-ручками больных обеспечивают компании-производители бесплатно
		Шприц-ручка Ново Пен III				
		Шприц-ручка Ново Пен Деми				
		Шприц-ручка Опти Пен Про-1				
	Тест-полоски для визуального определения уровня глюкозы в крови	Тест-полоски «Бетачек» № 50			2 упаковки/месяц	
		Тест-полоски «Глюкохром Д» № 50			2 упаковки/месяц	
		Тест-полоски «Диаглюк» № 50			2 упаковки/месяц	
	Тест-полоски для глюкометров	Тест-полоски «Акку Чек» № 50			2 упаковки/месяц	Тест-полосками к глюкометрам снабжаются отдельные категории
Тест-полоски «Уан Тач Ультра» № 50				2 упаковки/месяц		

		Тест-полоски «Сателлит» № 50		2 упаковки/месяц	больных сахарным диабетом (дети, подростки, студенты, беременные женщины, слабовидящие пациенты).
--	--	---------------------------------	--	------------------	--

ЛЕЧЕНИЕ ЭНДОКРИННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ВЗРОСЛЫХ

Клинический вариант	Наименования препаратов		Форма выпуска, дозировка	Средняя доза на цикл	Длительность курса лечения	Примечание
	Международное	Торговые				
<u>Название заболевания: несахарный диабет</u>						
Несахарный диабет	Десмопрессин	Минирин	0,0001 №30 таб	0,0003-0,0004	Пожизненно	
<u>Название заболевания: гипотиреоз*</u>						
Гипотиреоз	Левотироксин	L-тироксин	100мкг, №100 таб	75-150 мкг	Пожизненно	
		Эутирокс	150мкг, №100 таб			
<u>Название заболевания: диффузный токсический зоб</u>						
	Тимазол	Тирозол, Мерказолил	0,005 № 50 таб	10 мг		
<u>Название заболевания: недостаточность коры надпочечников</u>						
Хроническая недостаточность коры надпочечников	Гидрокортизон	Кортеф	0,005 №100 таб	20-30 мг	Пожизненно	В малых дозах в сочетании с флудрокортизоном
			0,01 №100 таб			
			0,02 №50 таб			
	Преднизолон	Преднизолон	0,005 №100 таб	15 мг		В сочетании с гидрокортизоном или флудрокортизоном
Дексаметазон	Дексаметазон	0,00005 №50 таб	1 мг			
	Флудрокортизон	Кортинефф	0,0001 №100 таб	100 мкг	В сочетании с кортизоном или преднизолоном	
Острая недостаточность коры надпочечников	Гидрокортизон	Гидрокортизон	500 мг флак	500 мг	Для выведения из аддисонического криза	
	Преднизолон	Преднизолон	30 мг амп	180 мг		

* Только при наличии сопутствующего сахарного и несахарного диабета или хронической надпочечниковой недостаточности

ЛЕЧЕНИЕ ЭНДОКРИННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ

Клинический вариант	Наименования препаратов		Форма выпуска, дозировка	Средняя доза на цикл (мг)	Длительность цикла лечения	Примечание (среднее кол-во циклов)
	Международное	Торговые				
<u>Название заболевания: несахарный диабет</u>						
Несахарный диабет	Десмопрессин	Минирин	0,0001 №30 таб	0,0003-0,0004	Пожизненно	
Острая недостаточность коры надпочечников	Гидрокортизон	Гидрокортизон	500 мг флак	500 мг	Для выведения из аддисонического криза	
Преждевременное половое созревание	Трипторелин	Диферелин	3,75 мг №1 флак	1,85 мг-3,75 1 раз в 28 дней в/м	До возраста физиологического полового развития	
Гипофизарный нанизм	Соматропин	Нордилет	0,01 картридж	1,25-2 мг	До закрытия зон роста	
		Хуматроп	18МЕ №1 фл	4МЕ	До закрытия зон роста	
		Генотропин	16МЕ №1 фл	4МЕ	До закрытия зон роста	
	Тестостерон	Сустанон-250	1 мл №1 фл	0,5-1 мл в/м 1 раз в 3-4 нед	постоянно	
		Омнадрен				
	Этинилэстрадиол	микрофоллин	1 мг тб	0,01 мг/кг	постоянно	
Левотироксин	Л-тироксин, эутирокс	50-100 мкг №100 таб	25-150 мкг	постоянно		
Врожденная дисфункция коры надпочечников	Гидрокортизон	Гидрокортизон	500 мг флак	10-15 мг/кг	При кризе	
	Гидрокортизон	Кортеф	0,005 №50 таб	10-20 мг	Постоянно	
			0,01 №100 таб			
			0,02 №100 таб			
Преднизолон	Преднизолон	0,005 №100 тб	5-10 мг	Постоянно		
Флудрокортизон	Кортинефф	0,0001 №100 таб	100 мкг	Постоянно		

ЛЕЧЕНИЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Схемы лечения (аббревиатуры)	Наименования препаратов		Форма выпуска, дозировка	Средняя доза на цикл (мг)	Длительность цикла лечения	Примечание (среднее кол-во циклов)
	Международное	Торговые				
Название заболевания: рак молочной железы						
<i>Диссеминированные формы - гормонотерапия</i>						
Тамоксифен (монотерапия)	Тамоксифен	Тамоксифен	Табл. 0,01 №100, уп.	До прогресси- рования, постоянно по 20 мг/день	Постоянно	Постоянно
Фемара (монотерапия)	Фемара	Фемара	Табл. 2,5 мг №30, уп.	2,5 мг/день		
Анастрозол (монотерапия)	Анастрозол	Аримидекс	Табл. 0,001 г №30, уп.	1,0 мг/день	Постоянно, до прогрессировани я	Постоянно, до прогрессирования
Эксеместан (монотерапия)	Эксеместан	Аромазин	Табл. 0,025 г №30, уп.	0,025 г/день		
Мегестрол ацетат (монотерапия)	Мегестрол ацетат	Мегейс	Табл. 0,04 г №100, уп.	160 мг/день		
Аминоглутетимид	Аминоглутетимид	Мамомит, ориметен	Табл. 250 мг №100, уп	500 мг/день		
<i>Диссеминированные формы (1 линия)</i>						
АС	Доксорубицин	Доксорубицин (доксодем, адриабластин, адриамицин и др.)	50 мг и 10 мг, фл.	108	1 день	6
	Циклофосфамид	Циклофосфан	0,2 г во фл.	1080		
CAF	Доксорубицин	Доксорубицин (доксодем, адриабластин, адриамицин и др.)	50 мг и 10 мг, фл.	90	1 день	6
	Циклофосфамид		0,2 г во фл.	900		
	Фторурацил		5% р-р в амп. 5,0 мл	900		

<i>Диссеминированные формы (2-3 линии после исчерпанного эффекта антрациклинов и/или таксанов и рефрактерности к ним)</i>						
Кселода	Капецитабин	Кселода	Табл. по 0,5 №120, у п.	56 г	14 дней	6
Кселода+Таксотер	Капецитабин	Кселода	Табл. 0,5 №120, уп.	42 г	14 дней	6
	Доцетаксел	Таксотер	20 мг и 80 мг, фл.	108 мг		
Гемзар+Карбоплатин	Гемцитабин	Гемзар	0,2 г и 1,0 г, фл.	5400 мг	15 дней	4
	Карбоплатин	Платинол (карбоплатин, платинол и др.)	450 мг, 150 мг, фл.	900		

Диссеминированные формы с выраженным прогрессирующим течением 1-2 линии)

АТ	Доксорубицин	Доксорубицин (доксолем, адриабластин, адриамицин и др.)	50 мг и 10 мг, фл.	90	1 день	4
	Доцетаксел	Таксотер	20 мг и 80 мг, фл.	108		
АР	Доксорубицин	Доксорубицин (доксолем, адриабластин, адриамицин и др.)	50 мг и 10 мг, фл.	108	1 день	4
	Паклитаксел	Таксол (паклитаксел, аби- таксел, интаксел, митотакс)	30 мг, 100 мг, фл.	240		
	Доцетаксел	Таксотер	20 мг и 80 мг, фл.	108		
ТАС	Доксорубицин	Доксорубицин (доксолем, адриабластин, адриамицин и др.)	50 мг и 10 мг, фл.	90	1 день	4-6
	Циклофосфамид	Циклофосфан	0,2 г во фл.	900		

<i>Адьювантная- послеоперационная и в отдельных случаях неоадьювантная - дооперационная гормонотерапия</i>						
Тамоксифен (адьювантная терапия)	Тамоксифен	Тамоксифен	Табл. 0,01 №100, уп.	20 мг/день	Постоянно, до прогрессирования	Постоянно, до 5 лет
Фемара (адьювантная терапия)	Фемара	Фемара	Табл. 2,5 мг №30, уп.	2,5 мг/день		Постоянно, до прогрессирования
Фемара (неоадьювантная терапия)	Фемара	Фемара	Табл. 2,5 мг №30, уп.	2,5 мг/день	4 мес.	1
<i>Адьювантная и неоадьювантная химиотерапия — до и/или после оперативного лечения</i>						
CMF	Циклофосфамид	Циклофосфан	0,2 г во фл.	2520	14 дней	6
	Метотрексат	Метотрексат	20 и 50 мг, фл.	144		
	Фторурацил	Фторурацил	5% р-р 5,0 мл, амп.	2160		
CAF	Циклофосфамид	Циклофосфан	0,2 г во фл.	900	1 день	6
	Доксорубицин	Доксорубицин (доксолем, адриамицин, адриабластин и др.)	50 мг и 10 мг, фл.	90		
	Фторурацил	Фторурацил	5% р-р 5,0 мл, амп.	900		
AC	Доксорубицин	Доксорубицин (доксолем, адриамицин, адриабластин и др.)	50 мг и 10 мг, фл.	108	1 день	6
	Циклофосфамид	Циклофосфан	0,2 г во фл.	1080		
<i>Неоадьювантная и адьювантная химиотерапия, до или после операций. Случаи особого риска рецидива и метастазов</i>						
AT	Доксорубицин	Доксорубицин (доксолем, адриабластин, адриамицин и др.)	50 мг и 10 мг, фл.	90	1 день	4
	Доцетаксел	Таксотер	20 мг и 80 мг, фл.	108		

AP	Доксорубицин	Доксорубицин (доксолем, адриабластин, адриамицин и др.)	50 мг и 10 мг, фл.	108	1 день	4
	Паклитаксел	Таксол (паклитаксел, абитаксел, интаксел, митотакс)	30 мг, 100 мг, фл.	240		
Название заболевания: неходжкинские лимфомы						
СVP (СОР)	Циклофосфамид	Циклофосфамид	0,2 г, фл.	3600	5 дней	4
	Винкрестин	Винкрестин	0,5 мг или 1,0 мг, фл.	2,0		
	Преднизолон	Преднизолон	0,005 табл. №100	500		
СНОР	Доксорубицин	Доксорубицин (доксолем, адриамицин)	50 или 10 мг, фл.	90	5 дней	4
	Циклофосфамид	Циклофосфамид	0,2 г, фл.	1350		
	Винкрестин	Винкрестин	0,5 или 1,0 мг, фл.	2		
	Преднизолон	Преднизолон	0,005 табл. №100	500		
Лейкеран с преднизолоном	Хлорамбуцил	Лейкеран (хлорбутин)	0,002 или 0,005 табл. №25	150	15 дней	4
		Преднизолон	0,005 табл. №100	900		
СНОР-Vleo	Циклофосфамид	Циклофосфан	0,2 во фл.	1350	5 дней	2 (примуц. рефрактерные формы)
	Доксорубицин	Доксорубицин (доксолем, адриабластин, адриамицин и др.)	50 мг или 10 мг, фл.	90		
	Винкрестин	Винкрестин	0,5 мг или 1,0 мг, фл.	2		
	Преднизолон	Преднизолон	0,005 табл. №100	500		
	Блеомицин	Блеомицин	0,005 во фл.	50		
СОРР	Циклофосфамид	Циклофосфан	0,2 г во фл.	1000	14 дней	4

	Винкристин	Винкристин	0,5 мг или 1,0 мг, фл.	4		
	Прокарбазин	Натулан	50 мг Капс. №50	2500		
	Преднизолон	Преднизолон	0,005 табл. №100	1000		
CCNU-COP	Ломустин (белустин)	СееNU (белустин, ломустин)	0,04 Капс. №20	160	14 дней	3 (преимущ. рефрактерные формы и рецидивы)
	Циклофосфамид	Циклофосфан	0,2 г во фл.	1800		
	Винкристин	Винкристин	0,5 мг или 1,0 мг, фл	4,0		
	Преднизолон	Преднизолон	0,005 табл. №100	1000		
FVAP	Этопозид	Этопозид (вепезид)	100 мг фл. №10	600	15 дней	2 (преимущ. рефрактерные формы)
	Винбластин	Винбластин	5 мг или 10 мг, фл.	24		
(EVMP -с митоксантроном)	Цитарабин	Цитарабин	50 мг во фл	150		
	Цисплатин	Цисплатин	50 мг, 25 мг или 10 мг, фл.	240		
		(митоксантрон - условно)		10 мг, во фл.		
Название заболевания: лимфогранулематоз (болезнь Ходжкина ; лимфома Ходжкина)						
Винбластин (монотерапия)	Винбластин	Винбластин	5 мг или 10 мг во фл.	60 мг	6 недель	2
CCNU-OPP	Ломустин (белустин)	СееNU (ломустин, белустин)	капс.40 мг №20 в уп.	160 мг	14 дней	2
	Прокарбазин	Натулан	50 мг Капс. №50	2520 мг		
	Винкристин	Винкристин	1,0 мг во фл.	4,0 мг		
	Преднизолон	Преднизолон	0,005 табл. №100	1000 мг		
CVB	Ломустин (белустин)	СееNU (ломустин, белустин)	Капс. 40 мг №20	120	8 дней	2 (преимущ. для

	Винбластин	Винбластин	5 мг или 10 мг, фл.	20		рецидивов)
	Блеомицин	Блеомицетин	0,005 во фл.	20		
BMV	Блеомицин	Блеомицетин	0,005 во фл.	20	8 дней	2 (преимущ. для рецидивов)
	Метотрексат	Метотрексат	20 мг или 50 мг, фл.	140		
	Винбластин	Винбластин	5 мг или 10 мг, фл.	20		
EVA	Этопозид	Этопозид (вепезид и др.)	100мгр-р, фл., №10 или Капс. №10 по 100 мг или 50 мг	900 мг, фл. или 1000 мг капс.	5 дней	2 (преимущ. для рецидивов)
	Винкрестин	Винкрестин	1,0 или 0,5 мг, фл	2		
	Доксорубицин	Доксорубицин (доксолем, адриамицин и др.)	50 мг или 10 мг, фл.	90		
COPP/ABV	Циклофосфамид	Циклофосфан	0,2 г, фл	1000	14 дней	4
	Винкрестин	Винкрестин	1,0 мг, фл. или 0,5 мг	2.0		
	Прокарбазин	Натулан	50 мг в Капс. №50	1250		
	Преднизолон	Преднизолон	табл. 0,005 №100, уп.	1000		
	Доксорубицин	Доксорубицин (доксолем и ДР-)	50 мги 10 мг, фл.	45		
	Блеомицин	Блеомицин	0,005 во фл.	15		
	Винбластин	Винбластин	5 мг или 10 мг, фл.	ю		
CVPP	Циклофосфамид	Циклофосфан	0,2 во фл	2000	14 дней	4
	Винбластин	Винбластин	5 мг или 10 мг, фл	20		
	Прокарбазин	Натулан	50 мг в Капс. №50, уп.	2520		
	Преднизолон	Преднизолон	0,005 табл. №100	1000		
ABVD	Доксорубицин	Доксорубицин (доксолем, адриабластин, адриамицин и др.)	Фл. по 50 и 10 мг	90	14 дней	4

	Блеомицин (блеоцин)	Блеомицин	Фл. по 0.005	24		
	Винбластин	Винбластин	Фл. по 5 мг или 10 мг	20		
	Дакарбазин	Дакарбазин	Фл. по 0,2 г; 0.1 г	1350		
LOPP	Хлорамбуцил	Лейкеран (хлорбутин)	Табл. 0,002 или 0,005 №25 в уп.	140	14 дней	4 (Возможна замена винкристина на винбластин - 20 мг на цикл)
	Винкристин	Винкристин	Фл. 0,001	4,0		
	Прокарбазин	Натулан	Капс. 0,05 №50 в уп.	2500		
	Преднизолон	Преднизолон	Табл. 0,005 №100 или 50 в уп.	1000		
Название заболевания: рак головы и шеи, химиотерапия						
Фторурацил	Фторурацил	Фторурацил	5% амп. по 5 мл №10	2250	4 дня	4
Лейковорин	Лейковорин	Лейковорин (кальция фоли-нат и др.)	30 мг, 25 мг, 50 мг, фл.	108		
Цисплатин	Цисплатин	Цисплатин	50 мг, 25 мг, 10 мг, фл.	200		
Цисплатин	Цисплатин	Цисплатин	50 мг, 25 мг, 10 мг, фл.	144	3 нед.	4
Фторурацил	Фторурацил	Фторурацил	5% амп. по 5 мл №10	2160		
Метотрексат	Метотрексат	Метотрексат	50 мг, 20 мг, фл.	72		
Лейковорин	Лейковорин	Лейковорин	30 мг, 50 мг, фл.	540		
Доцетаксел	Доцетаксел	Таксотер	20 мг, 80 мг, фл.	135	1 день	4
Цисплатин	Цисплатин	Цисплатин	50 мг, 25 мг, 10 мг, фл.	135		
Название заболевания: лимфомы кожи, саркома Капоши, грибвидный микоз (распространенные формы)						
Проспидин	Проспидия хлорид	Проспидин	0,1 г во фл.	5,0 г	2 мес.	2-3 цикла
PPVP	Проспидия хлорид	Проспидин	0,1 г во фл	3000 мг	5 нед.	
	Циклофосфамид	Циклофосфан	0,2 г во фл.	6000 мг		
	Винбластин	Винбластин	5 мг во фл.	50 мг		
	Преднизолон	Преднизолон	0,005 г в табл. №100	900 мг		

Интерферон-альфа	Интерферон-альфа	Реаферон (реальдирон)	1 млн., 3 млн.ед, амп.	75 млн.ед., амп.	6 нед	2
Название заболевания: рак легкого						
<i>Мелкоклеточный рак легкого, распространенная форма</i>						
CAP	Циклофосфамид	Циклофосфан	0,2 г во фл.	1800	1 день	4
	Доксорубин	Доксорубин (доксолем, адриабластин, адриамицин и др.)	50 мг, 10 мг, фл.	90		
	Винкристин	Винкристин	1,0 мг и 0,5 мг, фл.	2		
EP	Этопозид	Этопозид (вепезид и др.)	100 мг в р-ре, амп.	648	3 дня	4
	Цисплатин	Цислатин	50 мг, 25 мг и 10 мг, фл.	144		
<i>Немелкоклеточный рак легкого, диссеминированные формы</i>						
ED	Этопозид	Этопозид (вепезид и др.)	100 мг в р-ре, амп.	648	1 день	4
	Цисплатин	Цислатин	50 мг, 25 мг и 10 мг, фл.	144		4
CAP	Доксорубин	Доксорубин (доксолем, адриабластин, адриамицин)	50 мг и 10 мг, фл.	90	1 день	4
	Циклофосфамид	Циклофосфан	0,2 г во фл.	900		4
	Цисплатин	Цисплатин	50 мг, 25 мг, 10 мг, фл.	90		
TC	Доцетаксел	Таксотер	20 мг, 80 мг, фл.	139	1 день	4
	Карбоплатин	Карбоплатин	450 мг, 150 мг, фл.	500		
Оральный этопозид (монотерапия)	Этопозид Оральный	Вепезид (оральный)	Капс. 100 мг и 50 мг	1400	14 дней	3-4

Немелкоклеточный рак легкого, распространенные формы (химиотерапия)						
Навельбин+Цисплатин	Винорельбин	Навельбин	10 мг во фл.	120	15 дней	3
	Цисплатин	Цисплатин	50 мг, 25 мг, 10 мг, фл.	140		
Гемзар+Навельбин	Гемцитабин	Гемзар	1,0 г и 0,2 г, фл.	4000	8 дней	3
	Винорельбин	Навельбин	10 мг во фл.	90		
Название заболевания: злокачественные опухоли яичка (семинома и несемйномные), местнораспространенные диссеминированные формы (включая адьювантную терапию)						
РЕВ-I	Блеомицин	Блеомицетин	5 мг во фл..	108	31 недели	4
	Этопозид	Этопозид (вепезид и др.)	100 мг в р-ре, фл.	900		
	Цисплатин	Цисплатин	50 мг, 25 мг и 10 мг, фл	180		
РЕВ-III	Этопозид	Этопозид (вепезид и др.)	100 мг в р-ре, фл.	1080	3 недели	4
	Цисплатин	Цисплатин	50 мг, 25 мг, 10 мг, фл.	180		
	Блеомицин	Блеомицетин	5 мг во фл.	18		
Название заболевания: злокачественные опухоли головного мозга (химиотерапия)						
Кармустин (монотерапия)	Кармустин	BCNU	0,1 г во фл.	140	3 дня	2-3
PCV	Лому стин	CCNU	Капс. 40 мг №20, уп.	198	29 дней	4
	Прокарбазин	Натулан	Капс. 50 мг №50, уп.	1400		
	Винкристин	Винкристин	0,5 мг и 1,0 мг во фл.	4		
Темозоломид (монотерапия)	Темозоломид	Темодал	Капс. 50 мг, 100 мг, 200 мг	1800	5 дней	2-3
Название заболевания: диссеминированная меланома кожи						
Дакарбазин	Дакарбазин	Дакарбазин (детисен)	0,1 г или 0,2 г, фл.	2000 мг	5 дней	3
DBDT	Дакарбазин	Дакарбазин	0,1 г или 0,2 г, фл.	1180 мг	21 день	3

		BCNU (кармустин)	100 мг во фл.	270 мг		
	Тамоксифен	Тамоксифен	табл. 10 и 20 мг	постоянно 20 мг/сут	постоянно	постоянно
		Цисплатин	10, 25, 50 мг во фл. №10	135 мг		
BVD	Блеомицин	Блеомицетин	0,005 фл.	50 мг	5 дней	3
	Винбластин	Винбластин	10 мг и 5 мг, фл.	20 мг		
	Цисплатин	Цисплатин	10, 25, 50 мг во фл.	80 мг		
Интерферон-альфа	Интерферон-альфа 2	Реаферон (реальдирон)	1 млн и 3 млн ед.амп.	27 млн/нед.	Мин.8 недель без перерыва	до прогрессирования
Пролейкин (интерлейкин-2)	Интерлейкин-2	Пролейкин (алдеслейкин)	фл. по 18-106МЕ	450-106МЕ	Мин.8 нед	до прогрессирования
Мюстофоран	Фотемустин	Мюстофоран	фл. по 208 мг	540 мг	3 недели	2
Название заболевания: рак почки, распространенные формы, гормоно- и иммунотерапия						
Фарестон (монотерапия)	Фарестон	Фарестон (торемифен)	Табл. 0,06 №60, уп.	360 мг/день постоянно	Постоянно, до прогрессирова- ния	Постоянно, до прогрессирования
Интерлейкин-2 (пролейкин)	Интерлейкин-2	Пролейкин (алдеслейкин)	Фл. по 18-10 ⁶ МЕ	450-10 ⁶ МЕ	Мин. 8 недель без перерыва	
Название заболевания: рак яичников II-IV стадий (неoadьювантная химиотерапия и химиотерапия после циторедуктивных операций)						
CC	Циклофосфамид	Циклофосфан	0,2 г во фл.	1000	1 день	6
	Карбоплатин	Карбоплатин	450 мг, 150 мг во фл.	550-700		
Неха-Carb	Алтретамин	Гексален	Капс, по 50 мг №40	3500	15 дней	4
	Карбоплатин	Карбоплатин	450 мг, 150 мг во фл.	450-600		
Неха-Vepesid	Алтретамин	Гексален	Капс, по 50 мг №40	3500	14 дней	4
		Вепезид оральн.	Капс, по 50 мг или 100 мг	1400		
Гемзар+карбоплатин (GC)	Гемцитабин	Гемзар	1,0 г; 0,2 г во фл.	3600	8 дней	4
	Карбоплатин	Карбоплатин	450 мг, 150 мг во фл.	450		

Название заболевания: рак тела матки

Рак эндометрия, распространенные формы (химио- и гормонотерапии)

АС	Доксорубицин	Доксорубицин (доксолем, адриабластин, адриамицин и др)	50 мги 10 мг, фл.	108	1 день	4
	Циклофосфамид	Циклофосфан	0,2 г во фл.	900		
САР	Циклофосфамид	Циклофосфан	0,2 г во фл.	900	1 день	4
	Доксорубицин	Доксорубицин (доксолем, адриабластин, адриамицин и др)	50 мги 10 мг, фл.	90		
	Цисплатин	Цисплатин	50 мг, 25 мг, 10 мг, фл.	90		
МСА	Мегестрол ацетат	Мегейс	40 мг, табл. №100	80 мг/сут	Постоянно	Постоянно
	Доксорубицин	Доксорубицин (доксолем, адриабластин, адриамицин и др)	50 мги 10 мг, фл.	72	1 день	4
	Циклофосфамид	Циклофосфан	0,2 г во фл.	720		
<i>Рак эндометрия - гормонотерапия</i>						
Медروксипрогестеро н ацетат (Провера)	Медроксипрогестер он ацетат	Провера	Табл. 0,1 г	200 мг/день постоянно	Постоянно, до прогрессирова ния	Постоянно, до про грессирования
Мегестрол ацетат	Мегестрол ацетат	Мегейс	Табл. 40 мг №100	160 мг/день		
Тамоксифен	Тамоксифен	Тамоксифен	Табл. 10 мг №100	20 мг/день		
Медроксипрогестеро н ацетат - Депо	Медроксипрогестер он ацетат	Депо-Провера	150 мг/мл амп. 5 мл	400 мг/мес.		
			100 мг/мл амп. 5 мл			
			400 мг/мл амп.			
			2,5 мл и 10 мл			

Название заболевания: рак мочевого пузыря						
<i>Внутрипузырная химиотерапия</i>						
Доксорубин (монотерапия)	Доксорубин	Доксорубин (доксолем и др)	50 мг и 10 мг во фл.	50	1 неделя	7
Митомицин С (монотерапия)	Митомицин С	Митомицин С (мутамицин)	2 мг и 20 мг во фл.	40	1 неделя	8
Тиофосфамид (монотерапия)	ТеоТепа	Тиофосфамид	15 мл во фл.	60	1 неделя	6
Цисплатин (монотерапия)	Цисплатин	Цисплатин	50 мг, 25 мг, 10 мг, фл.	60	1 мес.	4
<i>Распространенные формы (химиотерапия)</i>						
M-VAC	Метотрексат	Метотрексат	20 мг и 50 мг во фл.	162	22 дня	4
	Винбластин	Винбластин	5 мг во фл.	16		
	Доксорубин	Доксорубин (доксолем и др)	50 и 10 мг во фл.	54		
	Цисплатин	Цисплатин	50 мг, 25 мг, 10 мг, фл.	125		
Гемзар+цисплатин	Гемцитабин	Гемзар	0,2 г; 1,0 г во фл.	5400	21 день	4
	Цисплатин	Цисплатин	50 мг, 25 мг, 10 мг, фл.	126		
Гемзар+карбоплатин	Гемцитабин	Гемзар	0,2 г; 1,0 г во фл.	5400	21 день	4
	Карбоплатин	Карбоплатин	450 мг, 150 мг во фл.	600		
Название заболевания: рак органов желудочно-кишечного тракта (колоректальный рак, рак поджелудочной железы, рак желудка, рак желчных протоков, желчного пузыря) - аденокарцинома						
5-фторурацил+ Лейковорин (фолинат кальция)	Фторурацил	Фторурацил	амп. 5% р-р 5,0 мл №10.	3825	10	3
	Кальция фолинат	Лейковорин	25 мг, 50 мг, 100 мг, фл	560 мг инъек. или 250 мг табл.		
		(фолинат кальция)	табл. 15 мг №20			

Кселода+Элоксатин (оксалиплатин)	Капецитабин	Кселода	0,5 г табл. №120	. 56,0 г	14 дней	4	
	Оксалиплатин	Элоксатин	50 мг во фл.	200 мг			
ELF	Этопозид	Этопозид (вепезид)	100 мг амп. №10 в р-ре	600 мг	3 дня	3	
	Кальция фолинат	Лейковорин	25 мг, 100 мг, 50 мг фл.	1500 мг			
		Фторурацил	5% р-р, 5,0 мл, фл. №10	2700 мг			
UFT	UFT	UFT	капс, с 100 мг терафура и 224 мг урацила, №120	112 капс.	28 дней	2	
Гемзар (гемцитабин)	Гемцитабин	Гемзар	1,0 г или 0,2 г, фл	6,0 г	21 день	2	
Название заболевания: рак предстательной железы (местнораспространенные и диссеминированные формы, гормонотерапия)							
06	Флютаמיד (монотерапия)	Флютаמיד	Флуцином (флутаплекс)	Капс, по 250 мг №100	250 мг × 3 р. в день	Постоянно, до прогрессирования	Постоянно, до прогрессирования
	Гозерелин (монотерапия)	Гозерелин	Золадекс	Шприцы по 3,6 мг	3,6 мг/мес.		
	Андрокур (монотерапия)	Андрокур	Андрокур (ципротерон- TEVA)	Табл. 50 мг №100	200 мг/сут		
	Гексэстрол	Гексэстрол	Синестрол	2% р-р в масле, 1 мл в амп.	3 мл. 2% р-ра ежедн	Постоянно, до осложнений или прогрессирова- ния	Постоянно, до осложнений или про- грессирования
	Мегестрол ацетат	Мегестрол ацетат	Мегейс	Табл. 40 мг №100	160 мг/день	постоянно, до прогрессирова- ния	Постоянно, до про- грессирования
	Мегестрол ацетат	Мегестрол ацетат	Мегейс	Табл. 40 мг №100	40 мг/сут. вме- сте с андрокур- ром		
	Андрокур	Андрокур (ципроте- рон ацетат)	Андрокур (ципротерон- TEVA)	Табл.50 мг №100 у п.			

Хонван	Хонван	Фосфэстрол	6% р-р в амп. по 5,0 мл (0,3 г в амп.)	12,0 г (40 амп.)	10 дней	Постоянно, до прогрессирувания
Бусерелин	Бусерелин	Бусерелин-депо	3,75 мг во фл.	3,75 мг/мес	6 мес.	1
Вспомогательные препараты при химиотерапии, злокачественных опухолей различных локализаций						
<i>Противорвотные, антигиперкальциемические, стимулятор лейкопоза</i>						
Клодроновая кислота (метастазы в кости)	Клодроновая кислота	Бонефос	300 мг в амп. №5	1500 мг	5 дней	4
Ондансетрон (анти-эметик)	Ондансетрон	Зофран (эмесет)	4 мг, 8 мг во фл. и табл.	16 мг	1 раз в 3 нед.	4
Ленограстим	Ленограстим	Граноцит	33,6 МЕ во фл.	168 МЕ	5 дней	4
Молграмостим	Молграмостим	Лейкомакс	150 мкг, 300 мкг, 400 мкг	2000 мкг	5 дней	4
<i>Протекторы токсичности, стимуляторы лейкопоза</i>						
Кардиоксан (кардиопротектор при лечении антрациклинами)	Дексаизоксан	Кардиоксан	500 мг во фл. с буферным р-ром для разведения	2000 мг	3 нед	6
Беталейкин (протектор и стимулятор лейкопоза)	Интерлейкин-1 бета	Беталейкин	1 мкг во фл.	20 мкг	10 дней	6
Метадоксил (гепатопротектор)	Метадоксил	Метадоксил	500 мг в табл. №30	22,5 г (22500 мг)	15 дней	6

ЛЕЧЕНИЕ ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Клинический вариант	Наименование препаратов		Форма выпуска, дозировка	Средняя суточная доза	Длительность курса лечения	Примечание
	Международные	Торговые				
Наименование заболевания: Острый лейкоз (181 больной)						
Острый миело-бластный лейкоз (115 больных)	Цитарабин	Цитозар	Фл. 100 мг	300 мг	60 дн	100 больных
	6-меркаптопурин	меркаптопурин	Таб. 50 мг	150 мг	30 дн	50 больных
	Идарубицин	Идарубицин	Таб. 10 мг	20 мг	10 дн	50 больных
	CCNU	Ломустин Медак	Капс. 40 мг	120 мг	3 дн	100 больных
	доксорубицин	Доксорубицин	Фл. 10 мг	80 мг	10 дн	100 больных
	Трансретиноевая кислота	Весаноид	Капс. 10 мг	90 мг	90 дн	20 больных
	митоксантрон	Митоксантрон Новантрон	Фл. 20 мг	20 мг	10 дн	50 больных
	ленограстим	Граноцит	Фл. 300 мкг	300 мкг	10 дн	20 больных
	молграмостим	Лейкомакс	Фл. 400 мкг	400 мкг	10 дн	20 больных
	аллопуринол	Аллопуринол -Никомед	Таб. 100 мг	300 мг	60 дн	100 больных
	амикацин	Амикин	Фл. 500 мг	1000 мг	14 дн	80 больных
	ванкомицин	Ванкомицин Эдицин	Фл. 500 мг	1000 мг	14 дн	50 больных
	Меропенем	Меронем	флак. для в/в инъек., 1 гр.	3 гр	14 дн	30 больных
	цефепим	Максипим	Фл. 1 г	4 г	14 дн	30 больных
	ципрофлоксацин	Ципрофлоксацин	Таб. 500 мг	1 г	30 дн	100 больных
	ацикловир	Зовиракс Ацикловир-Акри	Таб. 200 мг	800 мг	30 дн	20 больных
	интраканазол	Орунгал	Таб. 100 мг	200 мг	60 дн	30 больных
	флуконазол	Дифлюкан	Таб. 150 мг	300 мг	60 дн	30 больных
	метронидазол	Метронидазол	Фл. 500 мг	1000 мг	10 дн	50 больных
	Ондансетрон	Зофран	Таб. 8 мг	24 мг	60 дн	90 больных
Кардиоксан	Кардиоксан	Фл. 500 мг	1000 мг	15 дн	100 больных	
Иммуноглобулин против гепатита В	Гепатект	Амп. 2 мл - 100 МЕ	4 мл	6 дн	40 больных	

	Иммуноглобулин человеческий нормальный	Интраглобин	Фл. 50 мл	100 мл	10 дн	40 больных
	Иммуноглобулин поливалентный	Пентаглобин	Фл. 50 мл	100 мл	3 дн	40 больных
	Интерлейкин 2 человека рекомбинантный	Пролейкин	Фл. 18 МЕ – 1 мг	18 МЕ	20 дн	10 больных
	Иммуноглобулин гипериммунный антицитомегаловиру сный	Цитотект	Фл 50 мл	100 мл	10 дн	20 больных
Острый лимфо- бластный лейкоз (66 больных)	6-меркаптопурин	Пуринетол	Таб.50 мг	150 мг	300 дн	20 больных
	6 тиогуанин	Ланвис	Таб.40 мг	120 мг	300 дн	15 больных
	Метотрексат	Метотрексат Метотрексат-Лэнс	Фл. 25 мг Таб. 20 мг	20 мг	50 дн	40 больных
	преднизолон	Преднизолон	Таб. 5 мг Амп. 30 мг	100 мг	60 дн	20 больных
	дексаметазон	Дексаметазон	Таб. 0,5 мг Амп.4 мг	12 мг	30 дн	30 больных
	циклофосфамид	Эндоксан	Таб. 200 мг Фл. 200 мг	400 мг	48 дн	40 больных
	винкристин	Винкристин	Фл. 1 мг	2 мг	10 дн	40 больных
	Цитарабин	Цитозар	Фл.100 мг	300 мг	10 дн	30 больных
	доксорубицин	Доксорубицин	Фл. 10 мг	80 мг	10 дн	20 больных
	митоксантрон	Митоксантрон Новантрон	Фл.20 мг	20 мг	10 дн	20 больных
	ленограстим	Граноцит	Фл. 300 мкг	300 мкг	15 дн	20 больных
	аллопуринол	Аллопуринол- Никомед	Таб. 100 мг	300 мг	60 дн	50 больных
	Кардиоксан	Кардиоксан	Фл. 500 мг	1000 мг	15 дн	50 больных
	амикацин	Амикин	Фл. 500 мг	1000 мг	14 дн	30 больных
ванкомицин	Ванкомицин Эдицин	Фл.500 мг	1000 мг	14 дн	20 больной	

	Меропенем	Меронем	флак. для в/в инъек., 1 гр.	3 гр	14 дн	20 больных
	цефепим	Максипим	Фл. 1 г	4 г	14 дн	20 больных
	ципрофлоксацин	Ципрофлоксацин	Таб. 250 мг	1 г	30 дн	50 больных
	ацикловир	Зовиракс Ацикловир-Акри	Таб. 200 мг	800 мг	30 дн	15 больных
	интраканазол	Орунгал	Таб. 100 мг	200 мг	60 дн	30 больных
	флуконазол	Дифлюкан	Таб. 150 мг	300 мг	60 дн	30 больных
	метронидазол	Метронидазол	Фл 500 мг	1000 мг	10 дн	25 больных
	Ондансетрон	Зофран	Таб. 8 мг	24 мг	60 дн	50 больных
	Иммуноглобулин против гепатита В	Гепатект	Амп. 2 мл - 100 МЕ	4 мл	6 дн	20 больных
	Иммуноглобулин человеческий нормальный	Интраглобин	Фл. 50 мл	100 мл	10 дн	30 больных
	Иммуноглобулин поливалентный	Пентаглобин	Фл. 50 мл	100 мл	3 дн	30 больных
	Котримоксазол	Бисептол	Таб. 480 мг	960 мг	30 дн	30 больных
	Иммуноглобулин гипериммунный антицитомегало- вирусный	Цитотект	Фл 50 мл	100 мл	10 дн	15 больных
Онкогематологические больные после трансплантации гемопоэтических стволовых клеток (50 больных)						
	Ленограстим	Граноцит	Фл. 300 мкг	300 мкг	15 дн	20 больных
	Эпозтин	Рекормон	Фл. 5000 ед	10000	50 дн	10 больных
	аллопуринол	Аллопуринол- Никомед	Таб. 100 мг	300 мг	30 дн	30 больных
	амикацин	Амикин	Фл. 500 мг	1000 мг	14 дн	30 больных
	ванкомицин	Ванкомицин Эдицин	Фл.500 мг	1000 мг	14 дн	30 больных
	Меропенем	Меронем	флак. для в/в инъек., 1 гр.	3 гр	14 дн	30 больных
	цефепим	Максипим	Фл. 1 г	4 г	14 дн	20 больных
	ацикловир	Зовиракс Ацикловир-Акри	Таб. 200 мг	800 мг	90 дн	30 больных
	интраканазол	Орунгал	Таб. 100 мг	200 мг	60 дн	20 больных

	флуконазол	Дифлюкан	Таб. 150 мг	300 мг	180 дн	30 больных
	кетоназол	Низорал	Таб. 200 мг	400 мг	30 дн	10 больных
	метронидазол	Метронидазол	Фл 500 мг	1000 мг	30 дн	20 больных
	Ондансетрон	Зофран	Таб. 8 мг	24 мг	10 дн	30 больных
	Иммуноглобулин человеческий нормальный	Интраглобин	Фл. 50 мл	100 мл	10 дн	20 больных
	Иммуноглобулин поливалентный	Пентаглобин	Фл. 50 мл	100 мл	5 дн	30 больных
	Котримоксазол	Бисептол	Таб. 480 мг	960 мг	90 дн	30 больных
	преднизолон	Преднизолон	Таб. 5 мг Амп. 30 мг	100 мг	60 дн	30 больных
	Микофенолат мофетил	Селсепт	Таб. 250 мг	2000 мг	90 дн	30 больных
	Ганцикловир	Цимевен	Капс. 250 мг Фл. 500 мг	1000 мг	60 дн	20 больных
	Циклоспорин А	Сандиммун	Капс. 100 мг Фл. 100 мл	300 мг	180 дн	20 больных
	Омепразол	Омепразол	Таб. 20 мг	40 мг	180 дн	10 больных
	Вифенд	Вифенд	Фл. 200 мг	400 мг	20 дн.	10 больных
	Амфотерицин В	Фунгизон	Фл. 50 мг	100 мг	10 дн	20 больных
	Антитимоцитарный глобулин	АТГАМ	Фл. 250 мг	1500 мг	5 дн	10 больных
	Метипред	Солюмедрол	Фл. 250 мг	500 мг	10 дн	10 больных
	Валтрекс	Валтрекс	Таб. 500 мг	1500 мг	90 дн	20 больных
Множественная миелома (387 больных)						
Множественная миелома	Мелфалан	Алкеран	Таблетки 2 мг	9 мг/м ²	8 курсов по 4 дня	150 больных
	Преднизолон	Преднизолон	Таблетки 5 мг	100 мг	8 курсов по 4 дня	150 больных
	Дексаметазон	Дексаметазон	Таблетки 0,5 мг	40 мг/сутки	8 курсов по 12 дней	100 больных
	Винкристин	Винкристин	Флаконы по 0,5мг, 1мг или 2 мг	0,5 мг/сутки	8 курсов по 4 дня	100 больных

	Доксорубицин	Доксорубицин	Флаконы по 10 мг	9 мг/м ²	8 курсов по 4 дня	100 больных
	в –эритропоэтин	Рекормон Эпокрин	Флаконы по 1000 или 2000 МЕ	20 МЕ/кг 3 раза в неделю	В течение года	150 больных
	альфа-интерферон	Интрон Реаферон Роферон	Флаконы по 1 или 3млн. МЕ	3 млн МЕ 3 раза в неделю	В течение года	150 больных
	Клодроновая кислота	Бонефос	Капсулы по 400 мг	1600 мг/сутки	В течение года	50 больных
	Золедоновая кислота	Зомета	Флаконы по 4 мг	4 мг 1 раз в месяц	В течение 6 мес.	150 больных
	Аллопуринол	Аллопуринол	Таблетки по 0,1г или 0,3 г	0,6 г/сутки	8 курсов по 21 дню	200 больных
	Итраконазол	Орунгал	Капсулы по 100 мг	400 мг/сутки		50 больных
	Ацикловир	Ацикловир Зовиракс	Таблетки по 200 мг	600 мг/сутки		40 больных
	Ко-тримаксозол	Бисептол	Таблетки по 480 мг	1920 мг/сутки		15 больных
	Ципрофлоксацин	Цифран	Таблетки по 250 или 500 мг	1000 мг/сутки		50 больных
	Доксициклин	Доксициклин	Капсулы по 0,1 г	0,1 г/сутки		20 больных
	Бортезомиб	Велкейд	Флаконы по 3,5 мг	2,0 мг/сут	На курс 4 введения – 9 мг (6 фл.); на год – 6 курсов	80 больных
Неходжкинские лимфомы, лимфома Ходжкина (3474 больных) и хронический лимфолейкоз (1601 больной)						
Неходжкинские злокачественные лимфомы	Циклофосамид	Циклофосфан	Флаконы, 200 мг	700 мг	3 дня в программе ФЦД и 5 дней в СОР	2100 мг (10,5 фл.) на 1 курс, 8 курсов в год – 16800 мг (84 фл.) на одного больного - на 500 больных (программа СОР и ФЦД)

	Флударабина фосфат	Флудара	Флаконы, 50 мг	50 мг	3 дня	150 мг (3 фл.) на 1 курс, 8 курсов в год – 1200 мг (24 фл.) на одного больного - на 450 больных (программа ФЦД)
			Капс.10 мг	60 мг	3 дня	150 больных
	Винкристин	Винкристин	Ампулы 1 мг	2 мг	1 день	2 мг (2 фл.) на 1 курс, 8 курсов в год – 16 мг (16 фл.) на одного больного 650 больных (программа СОР)
	Этопозид	Вепезид	Капсулы 50 мг	200 мг	5 дней	1000 мг (20 капс.- 1 упак.) на 1 курс, 8 курсов в год – 8000 мг (1600 капс.- 80 упак.) на одного больного - на 309 больных
	Преднизолон	Преднизолон	Таблетки 5 мг	60 мг	5 дней	300 мг (60 табл.- 1 упак.) на 1 курс, 8 курсов в год – 2400 мг (480 табл.- 5 упак.) на одного больного - на 900 больных
	Дексаметазон	Дексаметазон	Таблетки 0,5 мг	20 мг	3 дня	60 мг (120 табл. – 2 упак.) на один курс, 8 курсов в год - 480 мг (960 табл. – 10 упак.), - на 150 больных.
	Ципрофлоксацин	Ципрофлоксацин	Таблетки 0,25 мг	1 г	14 дней	14 г (56 табл. – 6 упак.) на один курс, 2 курса в год – 28 г (112 табл. – 11 упак.) - на 500 больных
	Цефепим	Максипим	Флаконы 500 мг	2 г	10 дней	20 г (40 фл.) на один курс, 800 г (1600 фл.) - на 30 больных

	Левифлоксацин	Таваник	Таблетки 250 мг	1 г	14 дней	14 г (56 табл. – 12 упак.) - на 80 больных
	Альфа-интерфе-роны	Реаферон	Ампулы 1 млн.	3 млн. 3 раза в неделю	В течение 1 года	432 млн. (44 упак.) в год на 1 больного - на 140 больных
		Роферон А	Флаконы 3 млн.	3 млн. 3 раза в неделю	В течение 1 года	432 млн (144 фл.) в год на 1 больного - на 120 больных.
	Бета- эритропозтин	Рекормон	Флаконы 5000 МЕ	10000 МЕ 3 раза в неделю	6 недель	180000 МЕ (36 фл.) на одного больного - на 150 больных.
		Эпрекс	10000 МЕ	10000 МЕ 3 раза в неделю	6 недель	180000 МЕ (18 фл.) на одного больного - на 150 больных.
	Внутривенные иммуноглобулины	Пентаглобин	Флаконы 50 мл	150 мл	3 дня	450 мл (9 фл.) на 1 курс для одного больного, 900 мл. (18 фл.) на 1 год - на 100 больных.
	Ацикловир	Ацикловир	Таблетки 200 мг	600 мг	10 дней	6000 мг (30 табл. – 3 упак.) на 1 курс для 1 больного - на 110 больных в год.
	Флюконазол	Дифлюкан	Таблетки 50 мг	100 мг	20 дней	2000 мг (40 табл.) на курс одному больному - на 150 больных.
	Ритуксимаб	Мабтера	Флаконы по 500 мг	500 мг/сут.	На курс 6 введений – 3000 мг (6 фл.); на год – 6 курсов	На 1 б-го 18000 мг (36 фл.) - на 300 больных
Лимфома Ходжкина (500 больных)						
Варианты с благо- приятным и проме- жуточным прогнозом	Адриабластин	Доксорубицин	Флаконы 10 мг	50 мг	6 – 8 мес. (по 2 дня в цикле– 8 циклов)	50 больных
	Доксорубицин	Доксорубицин	Флаконы 50 мг	50 мг	6 – 8 мес. (по 2 дня в цикле– 8 циклов)	150 больных

	Блеомицин	Блеомицин, бленоксан, блеоцин, БЛЕО	Флаконы 15 мг	15 мг	6 – 8 мес. (по 2 дня в цикле– 8 циклов)	50 больных
	Винбластин	Винбластин	Флаконы 10 мг	10 мг	6 – 8 мес. (по 2 дня в цикле– 8 циклов)	100 больных
	Дакарбазин	Дакарбазин, Детисен, ДТИК, Биокарбазин, Имидазол- карбоксамид	Флаконы 100 мг	600 мг	6 – 8 мес. (по 2 дня в цикле– 8 циклов)	50 больных
	Эмбихин	Мехлорэтамин, Мустарген	Ампулы 10 мг	10 мг	6 – 8 мес. (по 2 дня в цикле– 8 циклов)	50 больных
	Винкристин	Винкристин Онковин	Флаконы 1 мг	2 мг	6 – 8 мес. (по 2 дня в цикле– 8 циклов)	100 больных
	Прокарбазин	Натулан	Капсулы 50 мг	150 мг	6 8 мес. (14 дней цикла – 8 циклов)	50 больных
	Преднизолон	Преднизолон	Таблетки 5 мг	80 мг	6 8 мес. (14 дней цикла – 8 циклов)	200 больных
	Циклофосфамид	Эндоксан	Таблетки 50 мг	200 мг	6 – 8 мес. (10 дней цикла - 8 циклов)	100 больных
	Хлорамбуцил	Хлорбутин, Лейкеран	Таблетки 2 мг; 5 мг	10 мг	6 8 мес. (14 дней цикла – 8 циклов)	200 больных
Клинические варианты с неблагоприятным прогнозом	Адриабластин	Доксорубицин	Флаконы 10 мг	50 мг	6 – 8 мес. (1 день цикла – 8 циклов)	100 больных
	Циклофосфамид	Эндоксан Циклофосфамид	Флаконы 200 мг; 500 мг; 1000 мг	1000 мг	6 – 8 мес. (1 день в цикле – 8 циклов)	100 больных

	Этопозод	Этопозид Этопос VP- 16-213 Вепезид Ластет	Флаконы 100 мг / 5 мл	180 мг	6 – 8 мес. (5 дней цикла – 8 циклов)	100 больных
	Тенипозид	VM-26 Вумон Тенипозид	Флаконы 50 мг / 5 мл		6 – 8 мес. (5 дней цикла – 8 циклов)	100 больных
	Прокарбазин	Натулан	Капсулы 50 мг	150 мг	6 – 8 мес. (7 дней цикла – 8 циклов)	50 больных
	Винкристин	Винкристин Онковин	Флаконы 1 мг	0,5 мг	6 – 8 мес. (1 день цикла – 8 циклов)	100 больных
	Преднизолон	Преднизолон	Таблетки 5 мг	80 мг	6 8 мес. (14 дней цикла – 8 циклов)	200 больных
	Блеомицин	Блеомицин, бленоксан, блеоцин, БЛЕО	Флаконы 15 мг	15 мг	6 – 8 мес. (1 день цикла – 8 циклов)	75 больных
	Ленограстим G-CSF	Граноцит	Флаконы 13,4 млн. МЕ; 33,6 млн. МЕ; 47 млн. МЕ	35 млн. МЕ	10 дней в цикле – 8 циклов	70 больных
	Доксорубицин	Доксорубицин	Флаконы 10 мг	50 мг	1,3,5,7,9,11 нед. однократно в режиме Stanford V	50 больных
	Винбластин	Винбластин	Флаконы 10 мг	10 мг	1,3,5,7,9,11 нед. однократно в режиме Stanford V	50 больных
	Эмбихин	Мехлорэтамин Мустарген	Ампулы 10 мг	10 мг	1,5,9 нед. однократно в режиме Stanford V	50 больных

	Цитарабин	Цитарабин Цитозар Алексан Цитозинарабинозид Арабинозил цитозин Арацитидин	Флаконы 100 мг ; 500 мг; 1г	500 мг		100 больных
	Мелфалан	Мелфалан Алкеран L-РАМ	Ампулы 50 мг	240 мг		50 больных
	Кармустин	Кармустин Кармубрис Нутримон BCNU	Флаконы 100 мг	500 мг		30 больных
	Ломустин	Ломустин Белустин CCNU	Капсулы и таблетки 10 мг, 40 мг, 100 мг	170 мг	1 день цикла каждый 42 день – 4 цикла	
	Виндезин	Виндезин Эльдезин	Флаконы 1мг; 4 мг; 5 мг	5 мг	5 – 6 мес. (2 дня цикла – 6 циклов)	30 больных
	Дексаметазон	Дексаметазон	Ампулы 4 мг	60 мг	2 – 3 мес. (5 дней цикла – 2 цикла)	50 больных
	Цисплатин	Цисплатин ДДП Платидиам Платинол	Флаконы 25 мг; 50 мг; 100 мг	150 мг	2 – 3 мес. (1 день цикла – 2 цикла)	50 больных
	Метотрексат	Метотрексат Аметоптерин Метоптерин МТХ	Ампулы и флаконы 5мг; 50 мг; 100 мг; 1000 мг	50 мг		50 больных
	Метилпреднизолон	Метилпреднизолон Метипред	Таблетки 4 мг	150 мг		50 больных
Хронический лимфолейкоз (1626 больных)						
	Хлорамбуцил, лейкеран	Хлорбутин	Флаконы, 2 мг	8 мг	80 дней	640 мг (320 табл.- 6 упак.) на 1 курс на одного больного,

						576000 мг (288000 табл.- 2880 упак. по 100 табл.) на 900 больных
	Циклофосфамид	Циклофосфан	Флаконы, 200 мг	700 мг	5 дней	3500 мг (17,5 фл.) на 1 курс, на 8 курсов в год – 28000 мг (140 фл.) на одного больного, 19628000 мг (98140 фл.) на 701 больного
	Флударабина фосфат	Флудара	Флаконы, 50 мг	50 мг	3 дня	150 мг (3 фл.) на 1 курс, 8 курсов в год – 1200 мг (24 фл.) на одного больного - на 300 больных 200 больных
			Капс. 10 мг	60 мг	5 дней	
	Ритусимаб	Мабтера	Флаконы по 500 мг, 100 мг	600 мг	1 день	100 больных
	Винкристин	Винкристин	Ампулы 1 мг	2 мг	1 день	2 мг (2 фл.) на 1 курс, 8 курсов в год – 16 мг (16 фл.) на одного больного - на 400 больного
	Дексаметазон	Дексаметазон	Таблетки 0,5 мг	20 мг	3 дня	60 мг (120 табл. – 2 упак.) на один курс, 8 курсов в год – 480 мг (960 табл. – 10 упак.), 24000 мг (48000 табл. – 480 упак.) на 50 больных.
	Ципрофлоксацин	Ципрофлоксацин	Таблетки 0,25 мг	1 г	14 дней	14 г (56 табл. – 6 упак.) на один курс, 2 курса в год – 28 г (112 табл. – 11 упак.), 2800 г (11200 табл. – 1100 упак.) на 100 больных
	Цефепим	Максипим	Флаконы 500 мг	2 г	10 дней	20 г (40 фл.) на один курс - на 100 больных

	Левифлоксацин	Таваник	Таблетки 250 мг	1 г	14 дней	14 г (56 табл. – 12 упак.), 700 г (2800 табл. – 560 упак.)
	Бета- Эритропозтин	Рекормон Эпрекс	Флаконы 5000 МЕ	10000 МЕ 3 раза в неделю	6 недель	180000 МЕ (36 фл.) на одного больного - на 100 больных.
		Эпокрин	10000 МЕ	10000 МЕ 3 раза в неделю	6 недель	180000 МЕ (18 фл.) на одного больного, 1800000 МЕ (180 фл.) на 10 больных.
	Внутривенные иммуноглобулины	Пентаглобин	Флаконы 50 мл	150 мл	3 дня	450 мл (9 фл.) на 1 курс для одного больного, 900 мл. (18 фл.) на 1 год - на 50 больных.
	Ацикловир	Ацикловир	Таблетки 200 мг	600 мг	10 дней	6000 мг (30 табл. – 3 упак.) на 1 курс для больного, 240000 мг (1200 табл. – 120 упак.) на 40 больных в год.
	Флюконазол	Дифлюкан	Таблетки 50 мг	100 мг	20 дней	2000 мг (40 табл.) на курс одного больного, 100000 мг (2000 табл.) на 50 больных.
Волосатоклеточный лейкоз	Кладрибин	Леустатин	Флаконы 10 мг	8 мг	7 дней (курс лечения 1-3 цикла)	56 мг (21 флакон) на курс лечения 1 больного в год – на 20 больных
	Роферон А	Роферон А	Фл. 3 млн.ед	3 млн. 3 раза в неделю	В течение года постоянно	432 млн. (144 фл.) в год на 1 больного – на 100 больных
		Реаферон	Амп. по 1 млн ед.	3 млн. 3 раза в неделю	В течение года постоянно	На 100 больных

Хронический миелолейкоз (234 больных)						
Хроническая фаза	Альфа-интерферон	Реаферон	1 x10 ⁶ МЕ, 3 x10 ⁶ МЕ в амп	5 x10 ⁶ МЕ	Постоянно	На 50 больных
		Интрон А Роферон А	3 x10 ⁶ МЕ, 6 x10 ⁶ МЕ, 9 x10 ⁶ МЕ	5 x10 ⁶ МЕ	Постоянно	
	Гидроксимочевина	Гидреа, Гидроксиуреа	0,5 в капс.	2,0/сут.	Постоянно	50 больных
	Бусульфан	Миелосан, Милеран	0,002 в таб	0,006/сут	30 дней 2-3 р. в год	30 больных
	Аллопуринол	Аллопуринол	0,01 в таб.	0,03	30 дней 3 – 4 раза в год	10000 упаковок
Фаза акселерации	Гидроксимочевина	Гидреа, Гидроксиуреа	0,5 в капс.	6,0/сут.	15-20 дней ежемесячно	30 больных
	Иматиниб	Гливек	0,1 в капс.	0,6/сут	Постоянно	70 больных
	Цитозин -арабинозид	Цитарабин, Цитозар	0,1 во флак.	0,04	10-15 дней ежемесячно	70 больных
	Аллопуринол	Аллопуринол	0,01 в таб.	0,03/сут.	30 дней 4 раза в год	200 больных
	6-Меркаптопурин	Пуринетол	0,05 в таб.	0,05	30 дней 4-6 раз в год	50 больных
Сублейкемический миелоз (704 больных)						
	Альфа-интерферон	Реаферон	1x10 ⁶ МЕ, 3x10 ⁶ МЕ в амп.	2x10 ⁶ МЕ	Постоянно	150 больных
		Интрон А Роферон А	3 x10 ⁶ МЕ, 6 x10 ⁶ МЕ, 9 x10 ⁶ МЕ	2x10 ⁶ МЕ	Постоянно	
	Гидроксимочевина	Гидреа Гидроксиуреа	0,5 в капс.	1,0/сут.	Постоянно	150 больных
	Бусульфан	Миелосан Милеран	0,002 в таб.	0,004	30 дней 2-3 раза в год	50 больных
	Аллопуринол	Аллопуринол	0,01 в таб.	0,03	30 дней 2-3 раза в год	50 больных
6-Меркаптопурин	Пуринетол	0,05 в таб.	0,05	Постоянно	50 больных	

Истинная полицитемия (769 больных)						
	Альфа-интерферон	Реаферон	1x10 ⁶ МЕ, 3x10 ⁶ МЕ в амп.	2x10 ⁶ МЕ	Постоянно	100 больных
		Интрон А Роферон А	3 x10 ⁶ МЕ, 6 x10 ⁶ МЕ, 9 x10 ⁶ МЕ	2x10 ⁶ МЕ	Постоянно	
	Гидроксимочевина	Гидреа Гидроксиуреа	0,5 в капс.	1,0/сут.	Постоянно	100 больных
	Бусульфан	Миелосан Милеран	0,002 в таб.	0,004	30 дней 2-3 раза в год	50 больных
	6-Меркаптопурин	Пуринетол	0,05 в таб.	0,05	Постоянно	50 больных
Апластическая анемия (92 больных)						
Тяжёлая АА (ТАА)	Циклоспорин	Сандиммун – Неорал или Гексал	Капс. по 100 мг, 50 мг и 25 мг	500 мг пер- орально	12 мес	50 больных
АА умеренной степени тяжести (нАА)	- “ - “ - “ -	- “ - “ - “ -	- “ - “ - “ -	400 мг	6 мес	30 больных
Тяжёлая АА (ТАА)	Метилпреднизолон	Метипред	Фл. 250 мг	250 мг в/в	10 дней	30 больных
АА умеренной степени тяжести (нАА)	Дексаметазон	Дексаметазон	Таб. по 1,5 мг	4,5 мг	20 дней	20 больных
Тяжёлая АА (ТАА)	Дефероксамин	Десферал	Фл. по 500 мг	500 мг внутривенно	20 дней	20 больных
АА умеренной степени тяжести (нАА)	- “ - “ - “ -	- “ - “ - “ -	- “ - “ - “ -	500 мг	- “ - “ - “ -	20 больных
Тяжёлая АА (ТАА)	Эпоэтин-бета	Эпрекс, Рекормон	Фл. по 10000 МЕ	10000 МЕ	3 мес	20 больных
АА умеренной степени тяжести (нАА)	- “ - “ - “ -	- “ - “ - “ -	- “ - “ - “ -	10000МЕ	- “ - “ - “ -	20 больных
АА умеренной степени тяжести	Антитимоцитарный глобулин (АТГ)	АТГАМ	фл. по 20 мг	700 мг	5 дней	30 больных
Тяжёлая АА (ТАА)	Метилпреднизолон	Метипред	Таб. 4 мг	20 мг	10 дней	20 больных

АА умеренной степени тяжести (нАА)	Метилпреднизолон	Метипред	Таб. 4 мг	12 мг	10 дней	20 больных
Иммунная тромбоцитопеническая пурпура (1026 больных)						
	Метилпреднизолон	Метипред	Фл. по 250 мг	250 мг	15 дней	На 300 больных
	Дексаметазон	Дексаметазон	Таб. по 1,5 мг	6 мг	30 дней	На 200 больных
	Преднизон	Преднизолон	Таб. 5 мг	60 мг	21 день	На 500 больных
	Циклоспорин	Сандиммун	Капс. по 100 мг, 50 мг и 25 мг	500 мг	6 мес	На 80 больных
	Имуноглобулин нормальный человеческий	Интраглобин Сандоглобулин	фл. по 50 мг и по 100 мг фл по 3,0г и по 6,0 г,	3000-6000	2-5 дней	1 раз в месяц на 50 больных
Гемоглобинозы (12 больных)						
Талассемия	Дефероксамин	Десферал	Фл. по 500 мг	500 мг	30 дней	12 больных
Серповидно-клеточная анемия, тяжёлое течение	Дефероксамин	Десферал	Фл. по 500 мг	500 мг	30 дней	7 больных
Серповидно-клеточная анемия, тяжёлое течение	Гидроксикарбамид	Гидреа	Капс. по 500 мг	1000 - 2000 мг	2 - 3 мес	7 больных
Миелодиспластический синдром (305 больных)						
Рефрактерная цитопения с мультимедийной дисплазией, рефрактерная анемия, рефрактерная анемия с кольцевыми сидеробластами, рефрактерная анемия с избытком бластов	Дефероксамин	Десферал	500 мг флаконы	1000 мг	6 мес.	200 больных

Рефрактерная цитопения с мультимедийной дисплазией, рефрактерная анемия, рефрактерная анемия с кольцевыми сидеробластами	Эритропоэтин	<u>Эпрекс</u> Рекормон	10000 ед. флаконы	10000 – 20000 ед	8 – 12 нед.	200 больных
Рефрактерная цитопения с мультимедийной дисплазией, рефрактерная анемия, рефрактерная анемия с избытком бластов, хронический миеломоноцитарный лейкоз	α-интерферон	Реаферон	1 млн. ед. 3 млн. ед. флаконы	1 – 3 млн. ед.	6 – 12 мес.	50 больных
Рефрактерная анемия с избытком бластов, хронический миеломоноцитарный лейкоз	Идарубицин	Заведос	10 мг капсулы	40 мг/неделю	8-12 нед.	Однократно в неделю 50 больных
Рефрактерная анемия с избытком бластов, хронический миеломоноцитарный лейкоз	Мелфалан	Алкеран	2 мг таблетки	2 мг	2-6 нед.	20 больных
Рефрактерная цитопения с мультимедийной дисплазией, рефрактерная анемия, рефрактерная анемия с кольцевыми сидеробластами, рефрактерная анемия с избытком бластов	Циклоспорин А	Сандимун Неорал	50 мг 100 мг капсулы	250 – 500 мг	6 – 12 мес.	20 больных

Рефрактерная цитопения с мультимедийной дисплазией, рефрактерная анемия, рефрактерная анемия с кольцевыми сидеробластами, рефрактерная анемия с избытком бластов	Микофелат мофетила	Селлсепт	250 мг 500 мг капсулы	500 – 1000 мг	6-12 мес.	20 больных
Рефрактерная анемия с избытком бластов, хронический миеломоноцитарный лейкоз	Этопозид	Вепезид	50 мг капсулы	50 мг	1-2 мес.	20 больных
Рефрактерная цитопения с мультимедийной дисплазией, рефрактерная анемия, рефрактерная анемия с кольцевыми сидеробластами,	Десаметазон	Дксаметазон	1,5 мг табл.	3 мг – 4,5 мг	4 – 6 нед.	100 больных
Рефрактерная анемия с избытком бластов	АТРА	Весаноид	10 мг	60 – 90 мг	10 – 14 дней	20 больных

Гемофилия А (количество больных - 281)						
Тяжелая форма	Концентрат фактора VIII	Октанат Иммунат Козйт ДВИ Эмоклот Д.И.	Флаконы по 250,500, 1000 МЕ Флаконы по 250,500, 1000 МЕ Флаконы по 200-300 400-600 800-1300, дозировка плавающая Флаконы по 250,500, 1000 МЕ	40 МЕ на кг массы тела	В течение года	127 больных, из них: 68 больным из расчета 60.000 МЕ на каждого больного в год (120 флаконов по 500 МЕ); 59 больным из расчета 48.000 МЕ на каждого больного в год (96 флаконов по 500 МЕ).
	Преднизолон	Преднизолон	Таблетки по 0,005	От 0,03 до 0,005	В течение года	20 больных
Среднетяжелая форма	Концентрат фактора VIII	- « - « - « -	- « - « - «	40 МЕ на кг массы тела	В течение года	61 больной из расчета 24.000 МЕ на каждого больного в год (48 флаконов по 500 МЕ)
Легкая форма	Концентрат фактора VIII	- « - « - « -	- « - « - «	40 МЕ на кг массы тела	В течение года	93 больных, из них: 12 больных из расчета 12.000 МЕ на каждого больного в год (24 флакона по 500 МЕ); 81 больной – нуждается в переливаниях концентратов факторов по требованию

Гемофилия В (количество больных - 67)						
Тяжелая форма	Концентрат фактора IX	Октанайн Иммунин Аимафикс Д.И.	Флаконы по 250,500, 1000 МЕ Флаконы по 200,600, 1200 МЕ Флаконы по 250,500, 1000 МЕ	40 МЕ на кг массы тела	В течение года	20 больных из расчета 60.000 МЕ на каждого больного в год (120 флаконов по 500 МЕ)
	Преднизолон	Преднизолон	Таблетки по 0,005	От 0,03 до 0,005	В течение года	4 больных
Среднетяжелая форма	Концентрат фактора IX	_ « _ « _ « _	_ « _ « _ « _	_ « _ « _ « _	_ « _ « _ « _	12 больных из расчета 20.000 МЕ) на каждого больного в год (40 флаконов по 500 МЕ
Легкая форма	Концентрат фактора IX	_ « _ « _ « _	_ « _ « _ « _	_ « _ « _ « _	_ « _ « _ « _	30 больных – нуждаются в переливаниях концен-тратов ф. IX по требованию
Гемофилия А и В, ингибиторная форма (количество больных - 27)						
	Эптаког альфа	НовоСэвен ®	Флаконы по 1,2, 2.4, 4.8 мг	90 мкг на кг массы тела через каждые 2 часа (в среднем 3 инъекции до остановки кровотечения)	В течение года	22 больных гемофилия А 1 больной гемофилия В 4 больных с приобретенным ингибитором Годовая потребность 288 мг (240 флаконов по 1,2 мг)
	Активированный препарат протромбинового комплекса (АППК)	Фейба ТИМ 4	Флаконы по 500,1000 МЕ	85 МЕ на кг массы тела через каждые 8-12 часов до остановки кровотечения	В течение года	Годовая потребность 60.000 МЕ (120 флаконов по 500 МЕ)

	Концентрат человеческого протромбинового комплекса двойной вирусной инактивации	Уман комплекс Д.И.	Флаконы по 200, 500 МЕ	75 МЕ на кг массы тела через каждые 8-12 часов до остановки кровотечения		Годовая потребность 60.000 МЕ (120 флаконов по 500 МЕ) Препараты Фейба и Уман комплекс Д.И. взаимозаменяемые
Болезнь Виллебранда (количество больных - 2605)						
Тип 1, тяжелое течение	Концентрат фактора VIII с высоким содержанием фактора Виллебранда	Иммунат Коэйт ДВИ Эмоклот Д.И.	Флаконы по 250,500,1000 МЕ Флаконы по 200-300 400-600 800-1300, дозировка плавающая Флаконы по 250,500,1000 МЕ	20 МЕ на кг массы тела	В течение года	10 больных Годовая потребность 40.000 МЕ
Тип 3, тяжелое течение	Концентрат фактора VIII с высоким содержанием фактора Виллебранда	— « _ « _ « _	— « _ « _ « _	— « _ « _ « _	— « _ « _ « _	5 больных Годовая потребность 10.000 МЕ

Врожденный дефицит фактора X (количество больных - 2)						
Тяжелая форма	Концентрат человеческого протромбинового комплекса двойной вирусной инактивации	Уман комплекс Д.И.	Флаконы по 200, 500 МЕ	25 МЕ на кг массы тела	В течение года	1 больной Годовая потребность 60.000 МЕ (120 флаконов по 500 МЕ)
	Активированный препарат протромбинового комплекса (АППК)	Фейба ТИМ 4	Флаконы по 500,1000 МЕ	25 МЕ на кг массы тела	В течение года	Годовая потребность 60.000 МЕ (120 флаконов по 500 МЕ) Препараты Фейба и Уман комплекс Д.И. взаимозаменяемые
Врожденный дефицит фактора VII (количество больных - 9)						
	Эптаког альфа	НовоСэвен ®	Флаконы по 1,2, 2,4, 4.8 мг	40-60 мкг на кг массы тела	В течение года	Переливание препаратов производится по требованию
	Активированный препарат протромбинового комплекса (АППК)	Фейба ТИМ 4	Флаконы по 500,1000 МЕ	25 МЕ на кг массы тела	В течение года	

Врожденный дефицит фактора V (количество больных - 1)						
Тяжелая форма	Активированный препарат протромбинового комплекса (АППК)	Фейба	Флаконы по 500,1000 МЕ	25 МЕ на кг массы	В течение года	Годовая потребность 2000 МЕ
Врожденный или приобретенный дефицит фактора II (количество больных - 1)						
Тяжелая форма	Концентрат человеческого протромбинового комплекса двойной вирусной инактивации	Уман комплекс Д.И.	Флаконы по 200, 500 МЕ	25 МЕ на кг массы тела	В течение года	Годовая потребность 24000 МЕ
	Активированный препарат протромбинового комплекса (АППК)	Фейба	Флаконы по 500,1000 МЕ	25 МЕ на кг массы тела	В течение года	

ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Клинический вариант	Наименования препаратов		Форма выпуска, дозировка	Средняя доза	Длительность курса лечения	Примечание
	Международное	Торговые				
Название заболевания: хроническая почечная недостаточность						
	<i>Противоязвенные</i>					
Уремическая гастроэнтеропатия	омепразол	омепразол, гастрозол, лосек	табл., 20 мг, № 30 табл., 20 и 40 мг	1x1	4 нед.	
	фамотидин	фамотидин, гастросидин, квамател	табл., 20 мг, № 28	2x1		
	<i>Спазмолитики, анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты:</i>					
	дротаверин	дротаверин, но-шпа	табл., 40 мг №100		постоянно	
	баралгин	баралгин	амп. 5 мл № 5		постоянно	
	диклофенак	диклофенак	3 мл 75 мг № 5	1x2	1 нед.	
	диклофенак	диклофенак	свечи 100 мг № 10	1x2	1 нед.	
	нимесулид	найз	100 мг №30	1x2	1 нед.	
	<i>Противорвотные препараты</i>					
	метоклопрамид	церукал	табл., 10 мг, № 50	2x2	4 нед.	
	домперидон	мотилиум	табл. 10мг№ 30	1x2	4 нед.	
	<i>Бактерийные препараты</i>					
	бифидумбактерин	бифидумбактерин	5 доз, № 30	4x3	2 нед.	
	панкреатин	панзинорм, мезим-форте	капс, 150 мг №20	1x3		
фосфолипиды	эссенциале, эссливер	капс, 300 мг № 30	2x4	4 нед.		
урсодезоксихолевая к-та	урсосан	Капс, 250 мг № 50	2x1		При ЖКБ	

	Антациды и адсорбенты					
	алюминия гидроксид+магния гидроксид	гастал	табл, № 60	1x4		
Уремическая остеодистрофия, полинейропатия и другие метаболические нарушения, включая синдром хронического воспаления	Метаболические препараты					
	пирацетам	пирацетам, ноотобрил	табл., 400 мг № 60	2x3	2 мес.	
	Витамин Е	токоферол	капс., 200 мкг № 60	1x1		
	альфакальцидол,	эталфа, альфа- ОЗ Тева	Капс, 0,25 мкг № 30	1x1	постоянно	
	кальцитриол	остеотриол, рокальтрол	Капс, 0,25 мкг, № 30	1x1	постоянно	
	кальцитонин	миакальцик	спрей, 200 МЕ, № 1	1x1	постоянно	
	аллопуринол	аллопуринол	100 мг №50	1x1	постоянно	
	Спазмолитики, анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты:					
	диклофенак	диклофенак	3 мл 75 мг № 5	1x2	1 нед.	
	диклофенак	диклофенак	свечи 100 мг № 10	1x2	1 нед.	
	нимесулид	найз	100 мг №30	1x2	1 нед.	
	Антигистаминные препараты					
	хлоропирамин	супрамин	25 мг № 20	1x3	1 нед.	
	лоратадин	кларифарм	табл. 10 мг № 7	1x3	1 нед.	
Артериальная недостаточность кровообращения, аритмия	Ингибиторы АПФ					
	эналаприл	энап, ренитек	табл. 10 мг №20	1x2		
	лизиноприл	диротон	табл. 10 мг № 30	1x1		
	фозиноприл	моноприл	табл. 10 мг №28	1x1		
	Антагонисты АТ-II					
	лозартан	лозап, брозаар	табл. 50мг № 14	1x1		
кандесартан	атаканд	табл. 8 и 16 мг № 28	1x1			

<i>Антагонисты кальция</i>					
нифедипин	кордипин, кордафлекс, коринфар	табл. 10мг№ 50	1x3		
нифедипин-ретард	кордипин-ретард, адалат	табл. 30мг№ 10	1x1		
дилтиазем	кардил	табл. 60 мг № 30	1x3		
амлодипин	нормодипин, норваск	табл. 5 мг № 30	1x1		
верапамил-ретард	верапамил-ретард	табл. 180 мг №30	1x1		
<i>Бета-блокаторы</i>					
метопролол-сукцинат	беталок-ЗОК	25, 50 и 100 мг			
соталол	сотагексал	табл. 80 мг №30	1x2		
пропранолол	анаприлин	40мг№ 100	1x3		
карведилол	акродилол	25 мг №30	1x1		
<i>Гиполипидемические</i>					
сивмастатин	симвакард, вазилип	табл. 20 мг № 28	1x1		
<i>Мочегонные</i>					
фуросемид	фуросемид	40 мг № 50	2x1		
<i>Нитраты</i>					
изосорбида мононитрат	пектрол, эфокс	табл. 40 мг № 20	1x1		
изосорбида динитрат	кардикет-ретард	20 мг № 50	1x2		
нитроглицерин	нитроглицерин-	1% 10мл			
<i>Сердечные гликозиды</i>					
дигоксин	дигоксин	табл. 0,25 мг № 50	1x1		

	Антиаритмические препараты				
	амиодарон	кордарон	табл. 200 мг № 30	1x1	
	атенолол	атенолол	табл. 50 мг № 30	1x1	
Инфекционные осложнения	Пенициллины				
	амоксциллин (+клавулановая к-та)	амоксиклав, медоклав, аугментин	табл. 625 мг № 15	1x2	5 дней
	оксациллин	оксациллин	фл. 0,5 г	2x3	
	Цефалоспорины				
	цефтазидим (3)	форгум	фл. 1 г	1x2	10 дней
	цефтриаксон (3)	цефтриаксон, лендацин,	фл. 1 г	1x2	10 дней
	цефепим (4)	максипим	фл. 0,5 г	1x2	10 дней
	Карбопенемы				
	меропенем	Меронем	фл. 1,0г	1x1	1 нед.
	Макролиды				
	klarитромицин	кларитромицин	табл. 500 мг № 5, фл. 0,5	1x1	5 дней
	Гликопептиды				
	ванкомицин	эдицин	фл. 500 мг	1x3 в нед.	2 нед.
	Другие антибактериальные препараты				
	метронидазол	метронидазол	табл., 250 мг, № 20	1x2	1 нед.
ципрофлоксацин	ципрофлоксацин,	табл. 250 мг № 10	1x2	5 дней	
норфлоксацин	Нолицин Норбактин	табл. 400 мг №14	1x2	5 дней	

		<i>Антикоагулянты и антиагреганты</i>			
Для антикоагуляции в ходе диализа и синдром	гепарин	гепарин	25 000 ЕД	1000 и/пер	
	дипиридамол	курантил	табл. 25 мг № 100	1x4	
	ацетилсалициловая к-та	ацетилсалициловая к-та, тромбо-АСС	табл. 0,15 г № 10	1x2	
	пентоксифиллин	пентоксифиллин вазонит, трентал	табл. 100 мг №60	2x3 (1-ретард)	
Железо-эритропоэтин-дефицитная анемия	эпоэтин альфа	эпрекс	амп. 2000 ЕД № 6 амп., 10000 ЕД, № 6	постоянно в подобранной дозе	
	эпоэтин бета	рекормон	амп., 2000 ЕД, № 6 картриджи 10000 и 20000 со шприц-ручкой	постоянно в подобранной дозе	
	железа сульфат	сорбифер	табл. № 50	постоянно в подобранной дозе	
	железа сахарат	венофер	в/в, амп. 100 мг в 5 мл № 5	курсами до 1000	
	фолиевая к-та	фолиевая к-та	табл. 1 мг № 50	постоянно	

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ГЕМОДИАЛИЗЕ

Клинический вариант	Наименования препаратов		Форма выпуска, дозировка	Средняя доза	Длительность курса лечения	Примечание
	Международное	Торговые				
Название заболевания: Терминальная хроническая почечная недостаточность						
Кровезамещающие растворы и антисептики						
Используются для проведения сеанса гемодиализа	натрия хлорид 0,9%	натрия хлорид 0,9%	1000 мл №1		на каждый сеанс	
	глюкоза 5%	глюкоза 5%	500 мл № 1		на каждый сеанс	
	глюкоза 40%	глюкоза 40%	10мл№1		в ходе сеанса	
	полиглюкин	полиглюкин	фл. 200 мл № 1		в ходе сеанса	
	спирт этиловый	спирт этиловый	95% 0,15 кг		на каждый сеанс	
Уремическая гастроэнтеропатия	Противоязвенные					
	омепразол	омепразол, гастрозол, лосек	табл., 20 мг, № 30 табл. 20, и 40 мг	1*1	4 нед.	
	фамотидин	гастросидин, фамотидин, квамател	табл., 20 мг, № 28	2*1	4 нед.	
	Спазмолитики, анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты:					
	дротаверин	дротаверин, но-шпа	табл., 40 мг №100		постоянно	
	баралгин	баралгин	амп. 5 мл № 5		-«-	
	диклофенак	диклофенак	3 мл 75 мг № 5	1*2	1 нед.	
	диклофенак	диклофенак	свечи 100 мг № 10	1*2	1 нед.	
	нимесулид	найз	100 мг №30	1*2	1 нед.	
	Противорвотные препараты					
метоклопрамид	церукал	табл., 10 мг, № 50	2*2	4 нед.		

	домперидон	мотилиум	табл. 10мг№ 30	1*2	4 нед.	
	Бактерийные препараты					
	бифидумбактерин	бифидумбактерин	5 доз, № 30	4*3	2 нед.	
	панкреатин	панзинорм, мезим-форте	капс, 150 мг №20	1*3		
	фосфолипиды	эссенциале, эсливер	капс, 300 мг № 30	2*4	4 нед.	
	урсодезоксихолевая к-та	урсосан	Капс, 250 мг № 50	2*1		
	Антациды и адсорбенты					
	алюминия гидроксид+магния гидроксид	гастал маалокс	табл, № 30 суспензия, 250 мл, №1	1*1 1*3	2 нед.	
	Метаболические препараты					
	пиридоксин	пиридоксин	1 % амп. 1 мл № 10	после сеанса		
Уремическая остеодистрофия, полинейропатия и другие метаболические нарушения, включая синдром хронического воспаления	аскорбиновая к-та		аскорбиновая к-та	5% амп. 1 мл №10	после сеанса	
	цианкобаламин	цианкобаламин	500 мкг амп., 1 мл №10	после сеанса		
	тиамин	тиамин	5% амп., 1 мл № 10	после сеанса		
	пирацетам	пирацетам, ноотобрил	табл., 400 мг № 60	2*3		2 мее
	пирацетам	пирацетам	амп. 20% 5 мл № 10	2*2		2 нед.
	витамин Е	токоферол	капс.,200 мкг № 60	1*1		
	альфакальцидол	эталфа, альфа- ОЗ-Тева	Капс, 0,25 мкг № 30	1*1		постоянно
	кальцитриол	остеотриол, рокальтрол	Капс, 0,25 мкг № 30	1*1		постоянно

	кальцитонин	миакальцик	аэр. наз. 200 МЕ, 14 доз	1*3 в нед.	6 нед.	
	аллопуринол	аллопуринол	100 мг №50	1*1	постоянно	
	Антигистаминные					
	хлоропирамин	супрамин	25 мг № 20	1*3	1 нед.	
	лоратадин	кларифарм	табл. 10 мг № 7	1*3	1 нед.	
Артериальная недостаточность кровообращения, аритмия	Ингибиторы АПФ					
	эналаприл	энап, ренитек	табл. 10 мг №20	1*2	постоянно	
	лизиноприл	диротон	табл. 10 мг № 30	1*1	постоянно	
	фозиноприл	моноприл	табл. 10 мг №28	1*1	постоянно	
	Антагонисты АТ-II					
	кандесартан	атаканд	табл. 8 и 16 мг № 28	1*1	постоянно	
	Антагонисты кальция					
	нифедипин	кордипин, кордафлекс, коринфар	табл. 10мг № 50		1*3	постоянно
	нифедипин-ретард	кордипин-ретард, адалат	табл. 30мг № 10	1*1	постоянно	
	дилтиазем	кардил	табл. 60 мг № 30	1*3	постоянно	
	амлодипин	нормодипин, кардилопин	табл. 5 мг № 30	1*1	постоянно	
	верапамил-ретард	верапамил-ретард	табл. 180 мг №30	1*1	постоянно	
	Бета-блокаторы					
	Метопролол сукцинат	беталок-3ОК	25, 50, 100 мг		постоянно	
	соталол	сотагексал	табл. 80 мг №30	1*2	постоянно	
пропранолол	Анаприлин	40мг № 100	1*3	постоянно		
карведилол	Акродилол	25 мг №30	1*1	постоянно		

<i>Гиполипидемические</i>						
сивмастатин	симвакард, вазилип	табл. 20 мг № 28	1*1	постоянно		
<i>Мочегонные</i>						
фуросемид	фуросемид	40 мг № 50	2*1	постоянно		
<i>Нитраты</i>						
изосорбида мононитрат	пектрол, эфокс	табл. 40 мг № 20	1*1	постоянно		
изосорбида динитрат	кардикет-ретард	20 мг № 50		постоянно		
нитроглицерин	нитроглицерин-	1% 10мл	1*2	постоянно		
<i>Сердечные гликозиды</i>						
дигоксин	дигоксин	табл. 0,25 мг № 50	1*1	постоянно		
<i>Антиаритмические препараты</i>						
амиодарон	кордарон	табл. 200 мг № 30	1*1	постоянно		
атенолол	атенолол	табл. 50 мг № 30	1*1	постоянно		
амиодарон	кордарон	табл. 200 мг № 30	1*1	постоянно		
атенолол	атенолол	табл. 50 мг № 30	1*1	постоянно		
<i>Пенициллины</i>						
амоксциллин (+клавулановая к-та)	амоксиклав, медоклав,	табл. 625 мг № 15	1*2	5 дней		
оксациллин	оксациллин	фл. 0,5 г	2*3			
Инфекционные осложнения	<i>Аминогликозиды</i>					
	амикацин	амикацин, амикин	фл. 2 мл 0,5 г		2 нед.	
	<i>Цефалоспорины</i>					
цефазолин (1)	цефазолин, цефамезин	фл. 1 г	1*2	10 дней		

	цефуроксим (2)	зинацеф, аксетил	фл, 1 г	1*2	10 дней	
	цефтазидим (3)	фортум	фл. 1 г	1*2	10 дней	
	цефтриаксон (3)	цефтриаксон, лендацин, медаксон	фл, 1 г	1*2	10 дней	
	цефепим (4)	максипим	фл. 0,5 г	1*2	10 дней	
	Карбопены					
	меропенем	Меронем	фл 1,0г	1*1	1 нед.	
	Макролиды					
	klarитромицин	клацид	табл. 500 мг № 5, фл. 0,5	1*1	5 дней	
	азитромицин	азитромицин, сумаamed	капс. 250 мг № 6	(1-2)*1	3 дня	
	Гликопептиды					
	ванкомицин	эдицин	фл. 500 мг	1*3 в нед.	2 нед.	
	Другие антибактериальные препараты					
	метронидазол	метронидаз	табл., 250 мг, № 20	1*2	1 нед.	
	ципрофлоксацин	ципрофлоксацин, цифран	табл. 250 мг № 10	1*2	5 дней	
	норфлоксацин	Нолицин норбактин	табл. 400 мг №14	1*2	5 дней	
	Противогрибковые					
	флуконазол	дифлюкан, дифлазон	Капс. 150 мг № 1	50мг*1	7 дней	
Для антикоагуляции в ходе диализа и синдром гиперкоагуляции	Антикоагулянты и антиагреганты					
	гепарин	гепарин	25 000 ЕД	7500 на сеанс		
	низкомолекулярные гепарины	клексан, фрагмин	(0,6) №10	0,6 на сеанс		
	дипиридамол	курантил	табл. 25 мг № 100	1*4		

	ацетилсалициловая к-та	ацетилсалициловая к-та, тромб-АСС	табл. 0,325 г №10	1*2		
	пентоксифиллин	пентоксифиллин азонит, трентал	табл. 100 мг №60	2*3 (1-ретард)		
Железо-эритропоэтин-дефицитная анемия	эпоэтин альфа	эпрекс		амп. 2000 ЕД № 6 амп., 10000 ЕД, № 6	постоянно в подобранной дозе	
	эпоэтин бета	рекормон	амп., 2000 ЕД, № 6 картриджи 10000 и 20000 со шприц-ручкой	постоянно в подобранной дозе		
	железа сульфат	сорбифер	табл. № 50	постоянно в подобранной дозе		
	железа сахарат	венофер	в/в, амп. 100 мг в 5 мл № 5	курсами до 1000		
	фолиевая к-та	фолиевая к-та	табл. 1 мг № 50	постоянно		

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ПЕРИТОНЕАЛЬНОМ ДИАЛИЗЕ

Клинический вариант	Наименования препаратов		Форма выпуска, дозировка	Средняя доза на цикл (мг)	Длительность цикла лечения	Примечание
	Международное	Торговые				
Артериальная недостаточность кровообращения, аритмия	Ингибиторы ЛПФ					
	эналаприл	энап, ренитек	табл. 10 мг №20	1x2	постоянно	
	лизиноприл	диротон	табл. 10 мг № 30	1x1	постоянно	
	фозиноприл	моноприл	табл. 10 мг №28	1x1	постоянно	
	Антагонисты АТ-II					
кандесартан	атаканд	табл. 8 и 16 мг № 28	1x1	постоянно		

<i>Антагонисты кальция</i>					
нифедипин	кордипин, кордафлекс, коринфар	табл. 10мг№ 50	1x3	постоянно	
нифедипин-ретард	кордипин-ретард, адалат	табл. 30мг№ 10	1x1	постоянно	
дилтиазем	кардил	табл. 60 мг № 30	1x3	постоянно	
амлодипин	нормодипин, кардилопин	табл. 5 мг № 30	1x1	постоянно	
верапамил-ретард	верапамил-ретард	табл. 180 мг №30	1x1	постоянно	
<i>Бета-блокаторы</i>					
Метопролол сукцинат	беталок-3ОК	25, 50, 100 мг		постоянно	
соталол	сотагексал	табл. 80 мг №30	1x2	постоянно	
пропранолол	анаприлин	40мг№ 100	1x3	постоянно	
карведилол	акродилол	25 мг №30	1x1	постоянно	
<i>Гиполипидемические</i>					
сивмастатин	симвакард, вазилип	табл. 20 мг № 28	1x1	постоянно	
<i>Мочегонные</i>					
фуросемид	фуросемид	40 мг № 50	2x1	постоянно	
<i>Нитраты</i>					
изосорбида мононитрат	пектрол, эфокс	табл. 40 мг № 20	1x1	постоянно	
изосорбида динитрат	кардикет-ретард	20 мг № 50	1x2	постоянно	
нитроглицерин	нитроглицерин-	1% 10мл		постоянно	
<i>Сердечные гликозиды</i>					
дигоксин	Дигоксин	табл. 0,25 мг № 50	1x1	постоянно	

Антиаритмические препараты					
амиодарон	кордарон	табл. 200 мг № 30	1x1	постоянно	
атенолол	атенолол	табл. 50 мг № 30	1x1	постоянно	
Противоязвенные					
омепразол	омепразол, гастрозол	табл., 20 мг, № 30	1x1	4нед.	
фамотидин	фамотидин, гастросидин, квamatел	табл., 20 мг, № 28			
Спазмолитики, анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты:					
дротаверин	дротаверин, но-шпа	табл., 40 мг №100		постоянно	
баралгин	баралгин	амп. 5 мл № 5		постоянно	
диклофенак	диклофенак	3 мл 75 мг № 5	1x2	1 нед.	
диклофенак	диклофенак	свечи 100 мг № 10	1x2	1 нед.	
нимесулид	найз	100 мг №30	1x2	1 нед.	
Противорвотные препараты					
метоклопрамид	Церукал	табл., 10 мг, № 50	2x2	4 нед.	
домперидон	Мотилиум	табл. 10мг№ 30	1x2	4 нед.	
Бактерийные препараты					
бифидумбактерин	бифидумбактерин	5 доз, № 30	4x3	2 нед.	
панкреатин	панзинорм, мезим-форте	капс, 150 мг №20	1x3		
фосфолипиды	эссенциале, эссливер	капс, 300 мг № 30	2x4	4 нед.	
урсодезоксихолевая к-та	урсосан	Капс, 250 мг № 50	2x1		

Уремическая
гастроэнтеропати
я

	Антациды и адсорбенты					
	алюминия гидроксид+магния гидроксид	гастал маалокс	табл, № 30 суспензия, 250 мл, №1	1x1 1x3	2 нед.	
	Метаболические препараты					
	пирацетам	пирацетам, ноотобрил	табл., 400 мг № 60	2x3	2 мес.	
	винпоцетин	кавинтон	табл. 5 мг № 50	1x3	2 мес.	
Уремическая остео дистрофия, полинейропатия и другие метаболические нарушения, включая синдром хронического воспаления	Витамин Е	токоферол	капс., 200 мкг № 60	1x1		
	альфакальцидол,	эталфа, альфа-ОЗ Тева	Капс, 0,25 мкг № 30	1x1	постоянно	
	кальцитриол	остеотриол, рокальтрол	Капс, 0,25 мкг, № 30	1x1	постоянно	
	кальцитонин	миакальцик	спрей, 200 МЕ, № 1	1x1	постоянно	
	аллопуринол	аллопуринол	100 мг №50	1x1	постоянно	
	Антигистаминные препараты					
	хлоропирамин	супрамин	25 мг № 20	1x3	1 нед.	
	лоратадин	кларифарм	табл. 10 мг № 7	1x3	1 нед.	
	Пенициллины					
	амоксициллин (+клавулановая к-та)	амоксиклав, медоклав,	табл. 625 мг № 15	1x2	5 дней	
	оксациллин	оксациллин	фл. 0,5 г	2x3		
Инфекционные осложнения	Аминогликозиды					
	амикацин	амикацин, амикин	фл. 2 мл 0,5 г	0,1	2 нед.	
	Цефалоспорины					
	цефазолин (1)	цефазолин, цефамезин	фл, 1 г	1x2	10 дней	

	цефуроксим (2)	зинацеф, аксетил	фл, 1 г	1x2	10 дней	
	цефтазидим (3)	фортум	фл. 1 г	1x2	10 дней	
	цефтриаксон (3)	цефтриаксон, лендацин, медаксон	фл, 1 г	1x2	10 дней	
	цефепим (4)	максипим	фл. 0,5 г	1x2	10 дней	
<i>Карбопены</i>						
	меропенем	Меронем	фл 1,0г	1x1	1 нед.	
<i>Макролиды</i>						
	klarитромицин	кларитромицин	табл. 500 мг № 5, фл. 0,5	1x1	5 дней	
<i>Гликопептиды</i>						
	ванкомицин	эдицин	фл. 500 мг	1x3 в нед.	2 нед.	
<i>Другие антибактериальные препараты</i>						
	метронидазол	метронидазол	табл., 250 мг, № 20	1x2	1 нед.	
	ципрофлоксацин	ципрофлоксацин, цифран	табл. 250 мг № 10	1x2	5 дней	
	норфлоксацин	Нолицин норбактин	табл. 400 мг №14	1x2	5 дней	
<i>Противогрибковые</i>						
	флуконазол	дифлюкан, дифлазон	Капс. 150 мг № 1	50мгх1	7 дней	
<i>Антикоагулянты и антиагреганты</i>						
	гепарин	гепарин	25 000 ЕД	1000 и/пер		
Для антикоагуляции в ходе диализа и	ацетилсалициловая к-та	ацетилсалициловая к-та, тромб-АСС	табл. 0,15 г № 10	1x2		

синдром	Пентоксифиллин	Пентоксифилин, трентал, вазонит	табл. 100 мг №60	2x3 (1-ретард)		
Железо- эритропоэтин- дефицитная анемия	эпоэтин альфа	эпрекс	амп. 2000 ЕД № 6 амп., 10000 ЕД, № 6	постоянно в подобранной дозе		
	эпоэтин бета	рекормон	амп., 2000 ЕД, № 6 картриджи 10000 и 20000 со шприц- ручкой	постоянно в подобранной дозе		
	железа сульфат	сорбифер	табл. № 50	постоянно в подобранной дозе		
	железа сахарат	венофер	в/в, амп. 100 мг в 5 мл № 5	курсами до 1000		
	фолиевая к-та	фолиевая к-та	табл. 1 мг № 50	постоянно		
	Антисептики	спирт этиловый	спирт этиловый	95% 0,05 кг	на каждый сеанс	